

## تقرير تفشي المرض رقم 130: جائحة فيروس كورونا 2019 (COVID-19)

تاريخ الإصدار: 12 يوليو 2022

552,257,440 حالة و 6,346,941 حالة وفاة

مصادر البيانات: منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي

تحديث التفشي: اعتبارًا في 11 يوليو 2022، تم الإبلاغ عن إجمالي 552,257,440 حالة COVID-19 و 6,346,941 حالة وفاة ذات صلة (معدل وفيات الحالات: 1.2 CFR%) من 232 دولة ومنطقة. فيما يلي توزيع الحالات التراكمي (نسبة الحالات العالمية) من مناطق الإبلاغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية (باستثناء أفريقيا: منطقة شرق المتوسط 18,709,946 (3%)، المنطقة الأوروبية 232,263,751 (42%)، منطقة الأمريكتين 164,536,248 (30%)، منطقة جنوب شرق آسيا (11%) 58,813,144 ومنطقة غرب المحيط الهادئ 65,607,512 (12%). في الأيام السبعة الماضية، أبلغت خمس دول عن أكبر عدد من الحالات الجديدة على مستوى العالم هي فرنسا (684,721)، إيطاليا (670,630)، ألمانيا (551,807)، الولايات المتحدة الأمريكية (472,920) واليابان (298,524). اعتبارًا في 11 يوليو 2022، أكثر من 4.7 مليار شخص (59% التعداد السكاني في العالم) تلقى التطعيم بالكامل لمزيد من المعلومات التفصيلية عن الحالات والوفيات المبلغ عنها خارج أفريقيا، يرجى الرجوع إلى لوحة معلومات COVID-19 التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

اعتبارًا في الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق أفريقيا في 11 يوليو 2022، تم الإبلاغ عن إجمالي 11,863,062 حالة و 254,408 COVID-19 حالة وفاة (CFR: 2.2%) في 55 دولة هم أعضاء الاتحاد الأفريقي (AU). والذي يمثل 2% من جميع الحالات و 4% من جميع الوفيات المبلغ عنها على مستوى العالم. أبلغت أربعون (73%) دولة عضو في الاتحاد الأفريقي عن تقارير إماتة أعلى من الإماتة العالمية. منذ بداية الجائحة (فبراير 2020)، شهدت 53 (96%) من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي موجة ثالثة، وشهدت 48 (87%) دولة موجة رابعة، وشهدت اثنان وعشرون دولة موجة خامسة من حالات COVID-19 بينما شهدت دولتان وهما كينيا وموريشيوس موجة سادسة.

أبلغت 53 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي (الشكل 2) عن وجود متغيرات جديدة؛ 50 دولة عضو أبلغت عن ألفا، بينما 45 دولة عضو أبلغت عن بيتا، 50 دولة عضو أبلغت عن متغير دلتا بينما أبلغت ثلاث دول عن متغير جاما وأبلغت 49 دولة عضو عن وجود متحور أوميكرون.


بالإضافة لذلك قد أبلغت 26 دولة عن المتحور أوميكرون 2.BA وقد أبلغت إحدى عشر دولة من الدول الأعضاء عن وجود المتحور أوميكرون 4.BA بينما أبلغت عشر دول من الدول الأعضاء عن وجود المتحور أوميكرون 5.BA.

توفر لوحة معلومات متابعة التحورات الجينية لفيروس الكورونا 2-SARS-COV تفصيلاً أنواع المتغيرات التي أبلغت عنها الدول الأعضاء. مزيد من المعلومات حول تسلسل 2-SARS-COV في أفريقيا متاحة على الرابط [Africa Pathogen](#)

[Genomics Initiative Dashboard](#).

أربع وخمسون (98%) من أصل 55 دولة عضوًا في الإتحاد الإفريقي بدأوا حملات تطعيم ضد الكورونا تستهدف جميع الفئات السكانية. وبشكل تراكمي، تم إعطاء 626.6 مليون جرعة في القارة. من بين هذه الجرعات التي تم إعطاؤها، تم تطعيم 318.1 مليون شخص جزئيًا، وتم تطعيم 276.5 مليون شخص بالكامل، وتلقى 32.3 مليونًا جرعة معززة. بشكل عام، تم تحصين 19.6% من سكان القارة بشكل كامل. إريتريا هي الدولة الوحيدة في الإتحاد الإفريقي التي لم تبدأ بعد إطلاق لقاح COVID-19.

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول لقاح COVID-19 على لوحة معلومات [لقاح COVID-19 Africa CDC](#)



الشكل 1: حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 التي تم الإبلاغ عنها أسبوعياً في أفريقيا من قبل منطقة الإتحاد الإفريقي،

15 فبراير 2020 حتى 10 يوليو 2022.

بالنسبة للأسبوع الوبائي السابع والعشرين ( 4 - 10 يوليو 2022): تم الإبلاغ عن 28,951 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 43% في عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع الوبائي السادس والعشرين. استحوذت المنطقة الشمالية على 67% من حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 المبلغ عنها هذا الأسبوع، تليها المنطقة الجنوبية (12%)، الشرقية (12%)، الغربية (9%) والوسطى (2%). سيشيل (219) بلغت عن أعلى معدل إصابة بـ COVID-19 حالة جديدة لكل مليون نسمة يومياً هذا الأسبوع ثم تليها كابوفيريدي (129).

في الأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن 143 حالة وفاة جديدة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 34% في عدد الوفيات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع السابق. تم الإبلاغ عن ما يقرب من 53% من هذه الوفيات من المنطقة الجنوبية، تليها المنطقة الشمالية (29%) والشرقية (14%) والغربية (3%) والوسطى (1%) في الأسبوع الماضي. الإجماليات التراكمية لحالات COVID-19 والوفيات وحالات الجديدة والوفيات التي تم الإبلاغ عنها خلال الأسبوع السابع والعشرين من قبل الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي ملخص في الجدول 1.

تم إجراء أكثر من 6 مليون اختبار COVID-19 في أفريقيا في الأسبوع الماضي. وهو ما يمثل زيادة بنسبة 973% مقارنة بالأسبوع الماضي. بالنسبة لمعدل الإيجابية الأسبوعية شهد انخفاضاً من 9.3% إلى 0.4%. منذ فبراير 2020، تم إجراء أكثر من 117 مليون اختبار COVID-19 في إفريقيا. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الحالة الوبائية في أفريقيا على لوحة معلومات [تحديثات كورونا اليومية](#) و [لوحات النقاط الساخنة](#).

الجدول 1. حالات الإصابة المؤكدة بـ COVID-19 والوفيات المبلغ عنها في أفريقيا للأسبوع الوبائي السابع والعشرين (4 - 10 يوليو 2022) المبلّغة من الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السادس والعشرين	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السادس والعشرين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-75%	4,553 (1)	-26%	371,707 (587)	المنطقة الوسطى
NA*	15 (0)	-100%	42,698 (0)	بوروندي
NA*	1,930 (0)	NA*	120,068 (0)	الكاميرون

<sup>1</sup> بسبب الإبلاغ عن اختبارات متراكمة أجريت بين أبريل ويوليو 2022 في العديد من المنشآت الصحية في مصر.

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السادس والعشرين	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السادس والعشرين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
NA*	113 (0)	-63%	14,712 (34)	جمهورية إفريقيا الوسطى
NA*	193 (0)	-100%	7,426 (0)	تشاد
NA*	386 (0)	NA*	24,421 (0)	الكونغو
-50%	1,354 (1)	-89%	91,778 (39)	جمهورية الكونغو الديمقراطية
NA*	183 (0)	222%	16,383 (296)	غينيا الإستوائية
-100%	305 (0)	11%	48,157 (218)	الجابون
-100%	74 (0)	-100%	6,064 (0)	ساو تومي وبرينسيبي
<b>-41%</b>	<b>27,426 (20)</b>	<b>-60%</b>	<b>1,444,317 (2,796)</b>	المنطقة الشرقية
NA*	160 (0)	-100%	8,139 (0)	جزر القمر
NA*	189 (0)	NA*	15,690 (0)	جيبوتي
NA*	103 (0)	NA*	9,824 (36)	إريتريا
No change	7,552 (11)	-46%	490,370 (1,029)	أثيوبيا
No change	5,660 (4)	-36%	335,861 (1,418)	كينيا
67%	1,403 (5)	-100%	65,381 (0)	مدغشقر
NA*	904 (0)	NA*	38,060 (0)	موريشيوس
-100%	1,460 (0)	-81%	126,386 (124)	رواندا
NA*	167 (0)	74%	45,000 (153)	سيشيل
NA*	1,361 (0)	-100%	26,865 (0)	الصومال

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السادس والعشرين	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السادس والعشرين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
NA*	138 (0)	-8%	17,758 (36)	جنوب السودان
NA*	3,909 (0)	-100%	62,624 (0)	السودان
NA*	800 (0)	-100%	35,366 (0)	تنزانيا
-100%	3,620 (0)	-100%	166,993 (0)	أوغندا
<b>-43%</b>	<b>83,909 (42)</b>	<b>-42%</b>	<b>3,655,482 (19,493)</b>	المنطقة الشمالية
NA*	6,875 (0)	43%	266,258 (129)	الجزائر
NA*	24,624 (0)	NA*	515,667 (0)	مصر
NA*	6,430 (0)	-100%	502,189 (0)	ليبيا
No change	986 (2)	23%	61,234 (982)	موريتانيا
167%	16,156 (40)	-3%	1,241,967 (18,382)	المغرب
-100%	28,748 (0)	-100%	1,066,127 (0)	تونس
NA*	90 (0)	NA*	2,040 (0)	الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
<b>-25%</b>	<b>127,133 (76)</b>	<b>-35%</b>	<b>5,534,527 (3,560)</b>	المنطقة الجنوبية
NA*	1,900 (0)	-100%	101,581 (0)	أنجولا
NA*	2,739 (0)	NA*	263,950 (0)	بوتسوانا
No change	1,417 (1)	25%	73,215 (79)	إيسواتيني
-100%	702 (0)	-70%	34,156 (14)	ليسوتو
100%	2,648 (2)	-28%	86,741 (165)	ملاوي
NA*	2,213 (1)	-20%	228,639 (456)	موزمبيق

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السادس والعشرين	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السادس والعشرين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-100%	4,065 (0)	-84%	166,229 (22)	ناميبيا
-21%	101,876 (64)	-30%	3,997,269 (1,978)	جنوب أفريقيا
-75%	4,008 (1)	-33%	326,794 (619)	زامبيا
-22%	5,565 (7)	-34%	255,953 (227)	زمبابوي
<b>-20%</b>	<b>11,387 (4)</b>	<b>-32%</b>	<b>856,699 (2,515)</b>	المنطقة الغربية
NA*	163 (0)	NA*	27,216 (264)	بنين
NA*	387 (0)	NA*	21,044 (0)	بوركينافاسو
100%	409 (4)	-63%	61,623 (518)	كابوفيردي
NA*	805 (0)	-31%	84,079 (420)	كوت ديفوار
NA*	365 (0)	NA*	12,009 (7)	جامبيا
-100%	1,453 (0)	-100%	166,816 (0)	غانا
NA*	781 (0)	-81%	37,366 (15)	غينيا
NA*	171 (0)	48%	8,400 (31)	غينيا بيساو
NA*	294 (0)	-25%	7,500 (3)	ليبيريا
NA*	737 (0)	-28%	31,187 (13)	مالي
NA*	310 (0)	NA*	9,096 (65)	النيجر
NA*	3,144 (0)	30%	258,517 (880)	نيجيريا
NA*	1,968 (0)	83%	86,504 (141)	السنغال
NA*	125 (0)	100%	7,718 (16)	سيراليون
NA*	275 (0)	6%	37,624 (142)	توجو
<b>-34%</b>	<b>254,408 (143)</b>	<b>-43%</b>	<b>11,862,732 (28,951)</b>	إجمالي

\* لم يتم الإبلاغ عن حالات / وفيات جديدة في الأسبوع السابق.

أنشطة الاستجابة الجديدة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا (ACDC):

#### الأنشطة العامة:

1. استضاف الدكتور أحمد إي أوجويل أوما ، القائم بأعمال مدير مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا ، مؤتمراً صحفياً أسبوعياً لمركز مكافحة الأمراض في إفريقيا يوم الخميس 7 يوليو 2022 الساعة 12 ظهرًا بتوقيت شرق أفريقيا. قدم تحديثاً عن حالة COVID-19 في جميع أنحاء القارة ، بما في ذلك جهود الاستجابة والتقدم المحرز في زيادة تغطية التطعيم ضد COVID-19. التسجيل متاح على صفحة [Africa CDC Twitter](#).

#### الأنشطة العملية:

1. عقد مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا وقسم اللوائح الصحية الدولية بوكالة الأمن الصحي بالمملكة المتحدة (UK HSA) جلسة افتراضية حول "قادة المختبرات المرنة" لـ 20 من قادة المختبرات في 5 يوليو 2022.

#### الترصد:

1. عقد مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا وشركاؤه ورشة عمل متعددة القطاعات لمراجعة إطار الترصد المبني على الحدث في إفريقيا (EBS) في الفترة من 6 إلى 9 يوليو 2022 في نيروبي، كينيا. تتمثل أهداف المراجعة في عكس المعرفة الحالية للترصد المبني على الحدث، ومعالجة الثغرات المحددة ، وتعزيز النهج متعدد القطاعات في الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي. ستشمل المراجعة الآن مكونات تتناول أنظمة إدارة الأحداث والمتابعة والتقييم.

#### التواصل من أجل المخاطر وإشراك المجتمع:

1. أجرى مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ومؤسسة بيل وميليندا جيتس، تدريباً لمدة ثلاثة أيام حول تعزيز الاستجابة لـ COVID-19 وفيروس نقص المناعة البشرية على المستويين الإقليمي والوطني للدول الأعضاء بمنطقة وسط أفريقيا في ياوندي، الكاميرون في الفترة من 5 إلى 7 يوليو 2022. الهدف من التدريب لتقوية مشاركة المجتمع وإدارة الشائعات ومعالجة المعلومات المضللة.

#### الأنشطة العلمية والمعايير واللوائح:

1. اشترك [هنا](#) لتلقي التحديث الأسبوعي للشراكة من أجل الاستجابة المستندة إلى الأدلة لـ (COVID-19 PERC) وجميع المنتجات الأخرى أو قم بزيارة موقع [PERC](#) و [Africa CDC website](#).

2. قم بالوصول إلى أحدث تقرير PERC حول "الاستجابة لـ COVID-19 في إفريقيا: ايجاد التوازن (الجزء الرابع) والدعوات إلى العمل" [هنا](#).

## توصيات للدول الأعضاء:

1. لتحقيق معدلات تغطية التطعيم العالمية البالغة 70% ، يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي الاستمرار في تنظيم وتنفيذ حملات التطعيم ضد فيروس كورونا COVID-19 ، مع التركيز على زيادة الأهلية<sup>2</sup> والطلب ، مع معالجة المعلومات الخاطئة.
2. أن تنفيذ إجراءات الصحة العامة والتدابير الاجتماعية ((PHSM مستهدف ومستنير بالوضع الحالي ل COVID-19 ، يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وضع نظام PHSM متدرج<sup>3</sup> .
3. ينبغي على جميع الدول الأعضاء أن تواصل تعزيز ترصدها COVID-19 لتشمل :
  - أ. الترصد المجتمعي<sup>5</sup> للكشف المبكر عن الحالات المصحوبة بأعراض لتقليل انتقال الفيروس. حيثما أمكن ، يمكن استخدام اختبارات المستضدات السريعة والاختبار الذاتي لتعزيز<sup>6</sup> جهود الفحص التشخيصي.
  - ب. الترصد السريع للوفيات<sup>7</sup> الذي يشمل جمع وتحليل واستخدام معطيات الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب التي تم جمعها من خلال الترصد المرتكز على المرافق الصحية أو المجتمع<sup>8</sup>.
  - ج. المراقبة الجينومية<sup>9</sup> لرصد وجود المتغيرات وانتشار الفيروس وتطوره المستمر.
  - د. المراقبة المتلازمة للأمراض الشبيهة بالإنفلونزا (ILI) والتهابات الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (SARI)<sup>10</sup>.
4. تُشجع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على:
  - أ. استمر في تتبع جهات الاتصال حيثما كان ذلك ممكناً بناءً على الوضع الوبائي الحالي وقدرة الدولة.
  - ب. قم بتوجيه الجمهور حول طلب الرعاية الطبية الفورية للأفراد الذين تظهر عليهم أعراض حادة ل COVID-19 (مثل صعوبة التنفس).
  - ج. إشراك علماء الاجتماع للمساعدة في إعلام وتعزيز حملات التطعيم وتنفيذ PHSM.
5. يجب على الدول الأعضاء إخطار وتبادل البيانات بشكل روتيني فيما يتعلق بحالات COVID-19 المؤكدة والوفيات والتعافي والاختبارات التي أجريت والعاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بمنظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض في إفريقيا لإبلاغ هذه التحديثات وغيرها باستمرار. أبلغ مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا عن طريق البريد الإلكتروني: [AfricaCDCEBS@africa-union.org](mailto:AfricaCDCEBS@africa-union.org)

<sup>2</sup> الرسوم البيانية للدعوة للتطعيم - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

<sup>3</sup> COVID-19 إطار الصحة العامة المتدرج والتدابير الاجتماعية لأفريقيا

<sup>4</sup> منظمة الصحة العالمية تعريف حالة COVID-19

<sup>5</sup> تعزيز مراقبة COVID-19 على مستوى المجتمع في إفريقيا

<sup>6</sup> إرشادات مؤقتة حول استخدام اختبارات المستضد السريع للاستجابة ل COVID-19 - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

<sup>7</sup> توجيهات مؤقتة بشأن الاختبار الذاتي لمضادات الضد السريع ل COVID-19 للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي - مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا

<sup>8</sup> الكشف عن حصيلة COVID-19: حزمة فنية للدول الأعضاء - المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها

<sup>9</sup> التوجيه التشغيلي المؤقت بشأن المراقبة الجينية ل SARS-CoV-2 في إفريقيا: دليل محدث

<sup>10</sup> بروتوكول لتعزيز أمراض الجهاز التنفسي الحادة الشديدة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا ل COVID-19 في إفريقيا - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

إفريقيا



مصادر لمزيد من المعلومات :

مصادر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض (ACDC)

- المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض تحديثات كورونا : <https://africacdc.org/covid-19/>
- استراتيجية القارة الأفريقية المشتركة وباء الكورونا: <https://africacdc.org/download/adapted-africa-joint-continental-strategy-for-covid-19-pandemic/>
- الموارد وإرشادات السياسة والرسوم البيانية : <https://africacdc.org/covid-19/covid-19-resources/>
- لوحات التحكم النقاط الساخنة و الصحة العامة والتدابير الاجتماعية لمركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا <https://africadccovid.org>
- لوحة التحكم في التطعيم في إفريقيا: <https://africacdc.org/covid-19-vaccination/>
- لوحة معلومات الجينومات المسببة للأمراض في إفريقيا: <https://africacdc.org/institutes/africa-pathogen-genomics-initiative>
- الشراكة من أجل الاستجابة القائمة على الأدلة لـ (COVID-19 PERC) <https://preventepidemics.org/covid19/perc/>
- إرشادات منظمة الصحة العالمية التقنية- <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>