



تقرير تفشي المرض رقم 148: جائحة فيروس كورونا 2019 (COVID-19)

تاريخ الإصدار 15 نوفمبر 2022

6,588,850 حالة وفاة 631,935,687

مصادر البيانات: منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي

تحديث التفشي: اعتباراً في 14 نوفمبر 2022، تم الإبلاغ عن إجمالي 631,935,687 حالة COVID-19 و 6,588,850 حالة وفاة ذات صلة (معدل وفيات الحالات: 1.1%) من 232 دولة ومنطقة. فيما يلي توزيع الحالات التراكبى (نسبة الحالات العالمية) من مناطق الإبلاغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية (باستثناء أفريقيا): منطقة شرق المتوسط 19,632,468 (3%), المنطقة الأوروبيّة 262,604,094 (41%)، منطقة الأمريكتين 180,478,700 (29%)، منطقة آسيا 60,538,645 (10%) ومنطقة غرب المحيط الهادئ 95,646,985 (15%). في الأيام السبعة الماضية، أبلغت خمس دول عن أكبر عدد من الحالات الجديدة على مستوى العالم هي اليابان (472,144)، ألمانيا (361,084)، كوريا الجنوبيّة (180,370)، الصين (167,668) وفرنسا (158,506). اعتباراً في 8 نوفمبر 2022، أكثر من 4.9 مليار شخص (62% التعداد السكاني في العالم) تلقى التطعيم بالكامل لمزيد من المعلومات التفصيلية عن الحالات والوفيات المبلغ عنها خارج أفريقيا، يرجى الرجوع إلى لوحة معلومات COVID-19 [التابعة لمنظمة الصحة العالمية](#).

اعتباراً في الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق أفريقيا في 14 نوفمبر 2022 ، تم الإبلاغ عن إجمالي 12,109,663 حالة COVID-19 256,086 حالة وفاة (CFR: 2.1%) في 55 دولة هم أعضاء الاتحاد الأفريقي (AU). والذي يمثل 2 % من جميع الحالات و 4 % من جميع الوفيات المبلغ عنها على مستوى العالم. أبلغت أربع وأربعون (80%) دولة عضو في الاتحاد الأفريقي عن تقارير إماتة أعلى من الإماته العالمية. منذ بداية الجائحة (فبراير 2020) ، شهدت 53 (96%) من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي موجة ثالثة، وشهدت 48 (87%) دولة موجة رابعة، وشهدت ثمان وعشرين دولة موجة خامسة من حالات COVID-19 بينما شهدت خمس دول وهما الجزائر وبوروندي وكينيا وموريشيوس وتونس موجة سادسة.


أبلغت 53 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي (الشكل 2) عن وجود متغيرات جديدة ؛ 50 دولة عضو أبلغت عن ألفا، بينما 45 دولة عضو أبلغت عن بيتا، 52 دولة عضو أبلغت عن متغير دلتا بينما أبلغت ثلاثة دول عن متغير جاما وأبلغت 51 دولة عضو عن وجود متغير أوميكرون. بالإضافة لذلك قد أبلغت 35 دولة عن المتغير BA.2 وقد أبلغت

إحدى وعشرون دولة من الدول الأعضاء عن وجود المتحور أوميكرون BA.4 أبلغت ثمانية عشر دول من الدول الأعضاء عن وجود المتحور أوميكرون BA.5 بينما أبلغت ثلاثة دول من الدول الأعضاء عن وجود المتحور أوميكرون XXB. توفر لوحة معلومات متابعة التحورات الجينية لفيروس الكورونا SARS-CoV-2 تفصيلاً أنواع المتغيرات التي أبلغت عنها الدول الأعضاء.

[Africa Pathogen Genomics Initiative](#) في أفريقيا متوفرة على الرابط [SARS-CoV-2 Dashboard](#).

أربع وخمسون (98%) من أصل 55 دولة عضواً في الاتحاد الإفريقي بدأوا حملات تطعيم ضد الكورونا تستهدف جميع الفئات السكانية. وبشكل تراكمي، تم إعطاء 763.7 مليون جرعة في القارة. من بين هذه الجرعات التي تم إعطاؤها، تم تطعيم 377 مليون شخص جزئياً، وتم تطعيم 351 مليون شخص بالكامل. بشكل عام، تم تحصين 25.1% من سكان القارة بشكل كامل. إريتريا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأفريقي التي لم تبدأ بعد إطلاق لقاح COVID-19.

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول لقاح COVID-19 على لوحة معلومات [للقاح COVID-19 Africa CDC](#).



الشكل 1: حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 التي تم الإبلاغ عنها أسبوعياً في أفريقيا من قبل منطقة الاتحاد الأفريقي، 15 فبراير 2020 حتى 13 نوفمبر 2022.

بالنسبة الأسبوع الرابع والأربعون (7 - 13 نوفمبر 2022) : تم الإبلاغ عن 7,643 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 37% في عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالاسبوع الوبائي الثالث والأربعون. استحوذت المنطقة الجنوبية على 49% من حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 المبلغ عنها هذا الأسبوع، تليها المنطقة الشرقية (31%) و الشمالية (11%) الغربية (5%) و الوسطى (4%). سيسيل (1,186) بلغت عن أعلى معدل إصابة 19 COVID-19 حالة جديدة لكل مليون نسمة يومياً هذا الأسبوع.

في الأسبوع الماضي (45)، تم الإبلاغ عن 31 حالة وفاة جديدة ، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 48% في عدد الوفيات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع السابق. تم الإبلاغ عن ما يقرب من 31% من هذه الوفيات من المنطقة الجنوبية، تليها المنطقة الشرقية (26%) الشمالية (26%) و الوسطى (19%). ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات وفاة من المنطقة الغربية هذا الأسبوع. الإجماليات التراكمة لحالات COVID-19 والوفيات وحالات الجديدة والوفيات التي تم الإبلاغ عنها خلال الأسبوع 45 من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ملخص في الجدول 1.

تم إجراء أكثر من 99,000 اختبار COVID-19 في أفريقيا في الأسبوع الماضي. وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 34% مقارنة بالأسبوع الماضي. بالنسبة لمعدل الإيجابية الأسبوعية 8%, يمثل زيادة بنسبة 100% مقارنة بالأسبوع الماضي. منذ فبراير 2020، تم إجراء أكثر من 123.7 مليون اختبار COVID-19 في إفريقيا. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الحالة الوبائية في أفريقيا على لوحة معلومات [تحديثات كورونا اليومية](#) و [لوحات النقاط الساخنة](#).

الجدول 1. العدد والنسبة المئوية لحالات COVID-19 المؤكدة والوفيات المبلغ عنها في أفريقيا منذ فبراير 2020 للنسبة الأسبوع الخامس والأربعون (7 - 13 نوفمبر 2022) من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

الدولة	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة مند الأسبوع الوبائي الرابع والأربعون	عدد الوفيات (جديدة)	النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة مند الأسبوع الوبائي الرابع والأربعون
المنطقة الوسطى	388,457 (404)	14%	4,601 (3)	200%
بوروندي	50,574 (57)	21%	15 (0)	NA*
الكامرون	123,993 (0)	NA*	1,965 (0)	NA*

الإتحاد الأفريقي



أفريقيا مأمأ
 مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها
 الحفاظ على صحة أفريقيا

الدولة	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الرابع والأربعون	عدد الوفيات (جديدة)	النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الرابع والأربعون
جمهورية إفريقيا الوسطى	388,496 (443)	25%	4,604 (6)	500%
تشاد	50,574 (57)	21%	15 (0)	NA*
الكونغو	123,993 (0)	NA*	1,965 (0)	NA*
جمهورية الكونغو الديمقراطية	15,296 (0)	-100%	113 (0)	NA*
غينيا الإستوائية	7,631 (4)	-43%	194 (0)	NA*
الجابون	24,837 (0)	NA*	386 (0)	NA*
ساو تومي وبرينسيبي	93,838 (370)	38%	1,365 (6)	500%
المنطقة الشرقية	17,085 (4)	-43%	183 (0)	NA*
جزر القمر	48,967 (8)	-43%	306 (0)	NA*
جيبوتي	6,275 (0)	-100%	77 (0)	NA*
إريتريا	1,478,280 (2,343)	43%	27,655 (8)	167%
أثيوبيا	8,879 (117)	30%	160 (0)	NA*
كينيا	15,960 (0)	NA*	189 (0)	NA*
مدغشقر	10,189 (0)	-100%	103 (0)	NA*
مورি�شيوس	494,185 (143)	40%	7,572 (0)	NA*
رواندا	340,431 (760)	45%	5,678 (0)	NA*
سيشيل	66,788 (42)	-29%	1,411 (0)	-100%
الصومال	40,767 (147)	NA*	1,022 (8)	NA*
جنوب السودان	132,567 (0)	NA*	1,466 (0)	NA*
السودان	49,862 (827)	NA*	171 (0)	-100%

الإتحاد الأفريقي



أفريقيا مُمأ
 مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها
 الحفاظ على صحة أفريقيا

الدولة	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الرابع والأربعون	عدد الوفيات (جديدة)	النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الرابع والأربعون
تنزانيا	27,243 (6)	-50%	1,361 (0)	NA*
أوغندا	18,318 (0)	-100%	138 (0)	NA*
المنطقة الشمالية	63,561 (52)	-17%	3,909 (0)	NA*
الجزائر	40,152 (98)	-61%	845 (0)	NA*
مصر	169,378 (151)	NA*	3,630 (0)	NA*
ليبيا	3,772,503 (798)	-16%	84,575 (8)	NA*
موريتانيا	270,897 (50)	178%	6,881 (0)	NA*
المغرب	515,667 (0)	NA*	24,624 (0)	NA*
تونس	507,060 (0)	-100%	6,437 (0)	NA*
الجمهورية ال العربية الصحراوية الديمقراطية	63,412 (20)	-46%	997 (0)	NA*
المنطقة الجنوبية	1,266,617 (619)	45%	16,283 (2)	NA*
أنجولا	1,146,702 (109)	-75%	29,263 (6)	NA*
بوتسوانا	2,148 (0)	NA*	90 (0)	NA*
إيسواتيني	5,586,325 (3,783)	91%	127,770 (9)	-83%
ليسوتو	103,131 (0)	NA*	1,917 (0)	NA*
ملاوي	263,950 (0)	NA*	2,739 (0)	NA*
موزambique	73,708 (90)	50%	1,422 (0)	NA*
ناميبيا	34,924 (0)	-100%	707 (0)	NA*
جنوب أفريقيا	88,028 (19)	90%	2,685 (0)	-100%
زامبيا	230,590 (47)	7%	2,224 (0)	NA*
زمبابوي	166,662 (0)	NA*	4,077 (0)	NA*
المنطقة	4,033,182 (3,240)	82%	102,371 (8)	-85%

الدولة	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الرابع والأربعون	عدد الوفيات (جديدة)	النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الرابع والأربعون
الغربية				
بنين	333,705 (21)	110%	4,018 (1)	NA*
بوركينا فاسو	258,445 (366)	NA*	5,610 (0)	NA*
كابوفيردي	882,843 (276)	-58%	11,482 (0)	-100%
كوت ديفوار	27,782 (0)	NA*	163 (0)	NA*
جامبيا	21,631 (0)	NA*	387 (0)	NA*
غانا	62,699 (133)	-21%	410 (0)	NA*
غينيا	87,860 (30)	-47%	829 (0)	-100%
غينيا بيساو	12,580 (0)	NA*	372 (0)	NA*
ليبيريا	170,972 (78)	-58%	1,460 (0)	NA*
مالي	38,173 (0)	NA*	796 (0)	NA*
النiger	8,831 (0)	NA*	176 (0)	NA*
نيجيريا	7,985 (0)	NA*	294 (0)	NA*
السنغال	32,745 (7)	No change	742 (0)	NA*
سيراليون	9,430 (0)	-100%	314 (0)	NA*
توجو	266,242 (0)	-100%	3,155 (0)	NA*
إجمالي	88,842 (21)	-22%	1,968 (0)	NA*

* لم يتم الإبلاغ عن حالات / وفيات جديدة في الأسبوع السابق.

أنشطة الاستجابة الجديدة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا (ACDC):

الأنشطة العامة:

1. استضاف الدكتور أحمد أوجوويل أوما ، القائم بأعمال مدير مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا ، المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمراكز مكافحة الأمراض في أفريقيا يوم الخميس 10 نوفمبر 2022 الساعة 12 ظهراً بتوقیت شرق أفريقيا. قدم تحدیتاً عن حالة COVID-19 في جميع أنحاء القارة ، بما في ذلك جهود الاستجابة والتقديم المحرز في زيادة تغطية التطعيم ضد COVID-19. التسجيل متاح على صفحة [Africa CDC Twitter](#) page.
2. أطلقت مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا بالتعاون مع مؤسسة ماستركارد البرنامج الإقليمي لإنقاذ الأرواح وسبل العيش في جنوب إفريقيا (SLL) الذي استضافته حكومة زامبيا ، في 11 نوفمبر 2022 في لوساكا ، زامبيا. كانت الأهداف هي تعزيز الوعي بدعم برنامج SLL لبرنامج MS على المستوى الوطني وبدء التنفيذ الكامل لبرنامج SLL لدعم MS في المنطقة.
3. أطلقت مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا بالتعاون مع مؤسسة ماستركارد من خلال برنامج SLL مبادرة Bingwa COVID-19 في منطقة الجنوب الأفريقي على هامش الإطلاق الإقليمي للجنوب الأفريقي لبرنامج SLL في لوساكا زامبيا ، في 11 نوفمبر 2022.

معلم

1. عقد مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا ورشة عمل استشارية حول اختبار COVID-19 المنقحة في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2022 ، في أكرا ، غانا. الهدف من هذا الاجتماع هو استكشاف دراسة تفعيل استراتيجية اختبار COVID-19 المنقحة في خدمات الرعاية الصحية الروتينية لضمان التوسيع المتعمد لخدمات اختبار COVID-19 ضمن برامج الأمراض الأخرى.
2. شاركت مبادرة الجينوميات المرضية (PGI) التابع لـ Africa CDC في منتدى باريس للسلام ، لمناقشة العمل الذي قامت به المبادرة لعرض عملها في الاستجابة لـ COVID-19 في إفريقيا ، في الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر 2022 في باريس ، فرنسا..

الأنشطة العلمية والمعايير واللوائح:

1. اشتراك [هنا](#) لتلقي التحديث الأسبوعي للشراكة من أجل الاستجابة المستندة إلى الأدلة لـ (COVID-19 PERC) وجميع المنتجات الأخرى أو قم بزيارة موقع [Africa CDC website](#) و [PERC](#).
2. قم بالوصول إلى أحدث تقرير PERC حول "الاستجابة لـ COVID-19 في إفريقيا: ايجاد التوازن (الجزء الرابع) والدعوات إلى العمل" [هنا](#).



توصيات للدول الأعضاء:

1. لتحقيق معدلات تغطية التطعيم العالمية البالغة 70٪ ، يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي الاستمرار في تنظيم وتنفيذ حملات التطعيم ضد فيروس كورونا COVID-19، مع التركيز على زيادة الأهلية¹ والطلب ، مع معالجة المعلومات الخاطئة.
2. أن تتنفيذ إجراءات الصحة العامة والتداير الاجتماعية (PHSM) مستهدف ومستنير بالوضع الحالي لـ COVID-19 ، يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وضع نظام PHSM متدرج.
3. ينبغي على جميع الدول الأعضاء أن تواصل تعزيز ترصدها² لـ COVID-19 لتشمل:
 أ. الترصد المجتمعي³ للكشف المبكر عن الحالات المصحوبة بأعراض لتقليل انتقال الفيروس. حيثما أمكن ، يمكن استخدام اختبارات المستضدات السريعة⁴ والالاختبار الذائي لتعزيز⁵ جهود الفحص التشخيصي.
 ب. الترصد السريع للوفيات⁶ الذي يشمل جمع وتحليل واستخدام معطيات الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب التي تم جمعها من خلال الترصد المركز على المرافق الصحية أو المجتمع.
- ج. المراقبة الجينومية⁷ لرصد وجود المتغيرات وانتشار الفيروس وتطوره المستمر.
- د. المراقبة المتلازمة للأمراض⁸ الشبيهة بالإإنفلونزا (AI) والتهابات الجهاز التنفسى الحادة الوخيمة (SARI).
4. شجع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على:
 أ. استمر في تتبع جهات الاتصال حيثما كان ذلك ممكناً بناءً على الوضع الوبائي الحالي وقدرة الدولة.
 ب. قم بتوجيه الجمهور حول طلب الرعاية الطبية الفورية للأفراد الذين تظهر عليهم أعراض حادة لـ COVID-19 (مثل صعوبة التنفس).
5. يجب على الدول الأعضاء إخطار وتبادل البيانات بشكل روتيني فيما يتعلق بحالات COVID-19 لمؤكدة والوفيات والتعافي والاختبارات التي أجريت والعاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بمنظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض في إفريقيا لإبلاغ هذه التحديات وغيرها باستمرار. أبلغ مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا عن طريق البريد الإلكتروني: AfricaCDCEBS@africa-union.org

مصادر لمزيد من المعلومات :

مصادر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض (ACDC)

¹ الرسوم البيانية للدعوة للتطعيم - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

² منظمة الصحة العالمية تعريف حالة COVID-19

³ تعزيز مراقبة COVID-19 على مستوى المجتمع في إفريقيا

⁴ إرشادات مؤقتة حول استخدام اختبارات المستضد السريع لـ COVID-19 - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

⁵ إرشادات مؤقتة حول استخدام اختبارات المستضد السريع لـ COVID-19 - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

⁶ الكشف عن حصيلة COVID-19: حزمة فنية للدول الأعضاء - المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها

⁷ التوجيه التشغيلي المؤقت بشأن المراقبة الجينية لـ SARS-CoV-2 في إفريقيا: دليل محدث

⁸ بروتوكول لتعزيز أمراض الجهاز التنفسى الحادة الشديدة والأمراض الشبيهة بالإإنفلونزا لـ COVID-19 في إفريقيا - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا



المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض تحديات كورونا :

- استراتيجية القارة الأفريقية المشتركة وباء الكورونا:
<https://africacdc.org/download/adapted-africa-joint-continental-strategy-for-covid-19-pandemic/>
- الموارد وإرشادات السياسة والرسوم البيانية :
<https://africacdc.org/covid-19/covid-19-resources/>
- لوحات التحكم النقاط الساخنة و الصحة العامة والتدابير الاجتماعية لمركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا
<https://africacdccovid.org>
- لوحة التحكم في التطعيم في إفريقيا:
<https://africacdc.org/covid-19-vaccination/>
- لوحة معلومات الجينوميات المسببة للأمراض في إفريقيا:
<https://africacdc.org/institutes/africa-pathogen-genomics-initiative>
- الشراكة من أجل الاستجابة القائمة على الأدلة لـ COVID-19 PERC (PERC)
<https://preventepidemics.org/covid19/perc/>
- إرشادات منظمة الصحة العالمية التقنية.-
<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>