

تقرير تفشي المرض رقم 53: جائحة فيروس كورونا 2019

(COVID-19) تاريخ الإصدار: 19 يناير 2021

93,665,676 حالة و 2,023,560 حالة وفاة

مصادر البيانات: منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي

تحديث التفشي : منذ التقرير الأخير (12 يناير 2021) ، تم الإبلاغ عالمياً عن 4,593,276 حالة مؤكدة¹ جديدة بمرض فيروس كورونا COVID-19 و 92,340 حالة وفاة حتى الآن . تم الإبلاغ عن إجمالي 93,665,676 COVID-19 و 2,023,560 حالة وفاة ذات صلة (معدل وفيات الحالات: 2.2%) من 221 دولة ومنطقة . فيما يلي توزيع الحالات التراكمي (نسبة الحالات العالمية) من مناطق الإبلاغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية (باستثناء أفريقيا) : إقليم شرق المتوسط 4,427,450 (5%) ، المنطقة الأوروبية 30,488,064 (33%) ، منطقة الأمريكتين 41,680,773 (45%) ، منطقة جنوب شرق آسيا 12,489,866 (13%) ومنطقة غرب المحيط الهادئ 1,279,018 (1%). من بين المواقع الشديدة التأثير، أبلغت الولايات المتحدة عن أكثر من مليون حالة جديدة كل أسبوع على مدار العشرة أسابيع الماضية على التوالي. خلال الأيام السبعة الماضية، أبلغت المملكة المتحدة والبرازيل عن أكثر من 200,000 حالة جديدة. لمزيد من المعلومات عن الحالات والوفيات التي يتم الإبلاغ عنها خارج إفريقيا ، يرجى الرجوع إلى التقارير اليومية لمنظمة الصحة العالمية².

اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا بتوقيت شرق إفريقيا (EAT) في 19 يناير 2021 ، تم الإبلاغ عن إجمالي 3,284,451 حالة COVID-19 و 79,633 حالة وفاة (CFR: 2.4%) في 55 دولة هم أعضاء الاتحاد الأفريقي (AU). والذي يمثل 3.5% من جميع الحالات المبلغ عنها على مستوى العالم. تواصل غالبية الدول الأعضاء (86%) الإبلاغ عن انتشار مجتمعي. من بين الدول التي أبلغت بيانات وبائية عن COVID-19 ، أبلغت عشرون دولة عن معدلات وفاة أعلى من المعدل العالمي البالغ 2.2%. وتشمل الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية (11.8%) ، السودان (6.1) ، مصر (5.5%) ، ليبيريا (4.4%) ، مالي (4%) ، تشاد (3.9%) ، النيجر (3.4%) ، غامبيا (3.3%) ، تونس (3.2%) ، جمهورية الكونغو الديمقراطية (3%) ، إيسواتيني (2.9%) ، جزر القمر (2.8%) ، جنوب إفريقيا (2.8%) ، زيمبابوي (2.8%) ، الصومال (2.7%) ، الجزائر (2.7%) ، سيراليون (2.6%) ، ملاوي (2.5%) ، موريتانيا (2.5%) ، أنغولا (2.3%) والسنغال (2.3%).

¹ إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن مراقبة COVID-19 وتعريف الحالة: <https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.7>

² لوحة معلومات منظمة الصحة العالمية الخاصة بمرض فيروس كورونا : <https://covid19.who.int/>

بالنسبة للأسبوع الوبائي الأول (11 يناير 2021 - 17 يناير 2021)، تم الإبلاغ عن 206,987 حالة جديدة من COVID-19 ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7٪ في عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع الوبائي 53 لعام 2020. غالبية حالات COVID-19 الجديدة تم الإبلاغ عنها لهذا الأسبوع هي من المنطقة الجنوبية (66٪) تليها المنطقة الشمالية (19٪) والغربية (9٪) والشرقية (3٪) ووسط إفريقيا (2٪). تشمل البلدان التي أبلغت عن أعلى معدل (حالة COVID-19 جديدة لكل 100,000 من السكان) هذا الأسبوع جنوب إفريقيا (183) وسيشيل (174) وتونس (166) وإسواتيني (108) والرأس الأخضر (93) وناميبيا (81) وبتسوانا (71) وليبيا (68) وزامبيا (55).

الجدول 1 يلقي الضوء على الحالات المبلغ عنها والوفيات الناجمة عن COVID-19 في جميع الدول الإفريقية للأسبوع الوبائي 1. كما يوضح الجدول المرحلة الحالية من الوباء لكل دولة . ويوضح الشكل 1 نزعة حالات COVID-19 الجديدة التي تم الإبلاغ عنها حسب اليوم والمنطقة منذ 15 فبراير وحتى تاريخه. تؤثر الآن موجة ثانية من الوباء على أفريقيا حيث استمرت الحالات في الزيادة خلال الشهرين الماضيين. حتى الآن ، هناك 39 دولة (71٪) من الدول الأعضاء تتعرض حالياً أو قد تعرضت لموجة ثانية من الحالات. هذا الأسبوع ، استأثرت خمس دول بحوالي 75٪ من حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 المُبلغ عنها وهي: جنوب إفريقيا (51٪) ، تونس (9٪) ، نيجيريا (6٪) ، زامبيا (5٪) والمغرب (4٪). في مواجهة كل من الموجة الثانية ووجود فيروس SARS-COV-2 501Y.V2 الجديد الذي يتم الإبلاغ عنه الآن من أربع دول أعضاء (بتسوانا وجنوب إفريقيا وزامبيا وكينيا) ، سيكون الالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية أمراً بالغ الأهمية في منع انتشار COVID-19.

الجدول 1. حالات الإصابة المؤكدة COVID-19 والوفيات وحالات الشفاء³ المبلغ عنها في إفريقيا للأسبوع الوبائي الأول (11 يناير 2021-17 يناير 2021)

مرحلة الوباء ⁴	النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السابق (1)	عدد الوفيات (جديدة)	النسبة المئوية للتغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السابق (1)	عدد الحالات (جديدة)	الدولة
	%129	(39) 1,550	%98	(3.968) 82.313	المنطقة الوسطى
3	*NA	(0) 2	%63	(153) 1.236	بوروندي
3	*NA	(4) 455	*NA	(922) 28,010	الكاميرون
3	*NA	(0) 63	%100-	(0) 4,973	جمهورية إفريقيا الوسطى
3	%100	(6) 113	%12-	(330) 2,919	تشاد
3	*NA	(6) 114	*NA	(492) 7,709	الكونغو
3	%92	(23) 634	%26	(1,624) 21,060	جمهورية الكونغو الديمقراطية
3	*NA	(0) 86	%306	(10) 5,365	غينيا الإستوائية
3	%100-	(0) 66	%67	(205) 9,899	الجابون
3	*NA	(0) 17	%81	(76) 1,142	ساو تومي وبرينسيبي
	%6-	(120) 6,421	%10-	(6.970) 343,603	المنطقة الشرقية
3	%440	(27) 45	%55	(442) 1,592	جزر القمر
3	*NA	(0) 61	%17	(34) 5,905	جيبوتي
3	%100-	(0) 6	%36	(321) 1,877	إريتريا
3	%22-	(36) 2,030	%7	(2,879) 131,195	أثيوبيا
3	%16-	(21) 1,731	%39-	(891) 99,162	كينيا

³ يتم التحقق من البيانات باستمرار للتأكد من دقتها وموثوقيتها ومع ذلك فقد تتغير بناءً على التحديثات بأثر رجعي من الدول الأعضاء
⁴ المراحل المحددة وفقاً لتوصيات مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا للاستجابة التدريجية لـ

<https://africacdc.org/download/recommendations-for-stepwise-response-to-covid-19/>: COVID-19 –


المرحلة 0 (لا توجد حالة COVID-19): لا توجد حالة تم الإبلاغ عنها داخل البلد؛ المرحلة 1 (التفشي في مرحلة مبكرة): حالة واحدة أو أكثر مستوردة، انتقال محلي محدود يتعلق بالحالات المستوردة؛ المرحلة 2 (توسيع الفاشية): زيادة عدد الحالات المستوردة، وزيادة الانتشار المحلي ولكن جميع الحالات مرتبطة بسلاسل انتقال معروفة، وتجمعات الفاشية ذات التعرض المشترك المعروف؛ المرحلة 3 (التقدم في تفشي المرض): تبدأ الفاشيات الموضعية في الاندماج، وتحدث حالة أو أكثر أو وفيات خارج انتقال معروف، وأجيال متعددة في سلاسل الانتقال، وتم اكتشاف الحالات بين حالات مرض الجهاز التنفسي الحاد الوخيم (SARI) دون التعرض المعروف؛ المرحلة 4 (تفشي واسع النطاق مع انتقال على الصعيد الوطني): انتقال مجتمعي مستدام واسع النطاق، يمكن تحديد سلاسل انتقال متعددة الأجيال ولكن معظم الحالات تحدث خارج السلاسل، والانتقال على مستوى المجتمع في جميع أنحاء البلاد أو كلها تقريباً.

3	*NA	(11) 273	*NA	(534) 18,301	مدغشقر
3	*NA	(0) 10	-33%	(8) 547	موريشيوس
3	%16	(22) 142	%47	(1,402) 11,032	رواندا
3	لا يوجد تغيير	(1) 2	%26-	(174) 705	سيشيل
3	*NA	(0) 130	%100-	(0) 4,744	الصومال
3	*NA	(0) 63	%89-	(8) 3,670	جنوب السودان
3	*NA	(0) 1,603	*NA	(0) 26,279	السودان
3	*NA	(0) 21	*NA	(0) 509	تنزانيا ⁵
3	%93-	(2) 304	%84-	(277) 38,085	أوغندا
	%1	(1,207) 27,215	%1-	1,027,728 (39,986)	المنطقة الشمالية
3	%17-	(29) 2,836	%3-	(1,689) 103,833	الجزائر
3	%2-	(386) 8,583	%13-	(6,605) 156,397	مصر
3	%73	(109) 1,698	%32	(4,491) 109,869	ليبيا
3	%31-	(18) 402	%27-	(527) 16,039	موريتانيا
3	%23-	(199) 7,942	%24-	(7,139) 459,671	المغرب
3	%46500	(466) 5,750	*NA	(19,535) 181,885	تونس
3	%100-	(0) 4	%100-	(0) 34	الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
	%14	(4,532) 40,197	%12-	1,528,938 (137,031)	المنطقة الجنوبية
3	%150	(20) 436	%24	(682) 18,875	أنغولا
3	%107	(29) 88	%40	(1,862) 18,630	بوتسوانا
3	%27	(81) 376	%1	(1,509) 12,944	إيسواتيني
3	%60-	(8) 93	%83-	(434) 6,371	ليسوتو
3	%197	(89) 314	%125	(3,895) 12,470	ملاوي
3	%113	(49) 241	%75	(4,612) 26,551	موزمبيق
3	%21-	(31) 285	%33-	(2,104) 30,363	ناميبيا
3	%10	(3,942) 37,105	%19-	1,337,926 (106,330)	جنوب أفريقيا
3	لا يوجد تغيير	(77) 546	%61	(9,877) 37,605	زامبيا
3	%62	(206) 713	%8-	(5,726) 27,203	زيمبابوي
	%47	(198) 3,647	%19	(19,032) 284,098	المنطقة الغربية
3	NA*	(2) 46	%106	(109) 3,413	بنين
3	%333	(13) 102	%7	(1,106) 9,188	بوركينافاسو
3	%100	(4) 119	%9	(560) 12,993	الرأس الأخضر
3	%100	(2) 141	%35	(1,491) 25,241	كوت ديفوار
3	%100	(2) 127	%7-	(53) 3,910	غامبيا

3	%200	(12) 352	%6-	(1,259) 58,065	غانا
2	*NA	(0) 81	%2	(185) 14,165	غينيا
2	*NA	(0) 45	لا يوجد تغيير	(31) 2,509	غينيا بيساو
2	*NA	(1) 84	*NA	(96) 1,896	ليبيريا
2	%40-	(12) 310	%31-	(239) 7,839	مالي
2	%13-	(14) 140	%32-	(279) 4,156	النيجر
1	%118	(85) 1,435	%26	(11,324) 110,387	نيجيريا
1	%14	(50) 515	%15	(1,783) 23,028	السنغال
1	%100-	(0) 77	%7	(172) 3,006	سيراليون
1	-75%	(1) 73	%35	(345) 4,302	توجو
	%12	(6,096) 79,030	-7%	3,266,680 (206,987)	إجمالي

* لم يتم الإبلاغ عن حالات / وفيات جديدة في الأسبوع السابق.

الشكل 1: حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 المُبلَّغ عنها حسب اليوم ومنطقة الاتحاد الأفريقي ، 15 فبراير 2020-19 يناير 2021



أنشطة الاستجابة الجديدة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا (ACDC):

الأنشطة العامة:

1. في الأسبوع الماضي ، حصل فريق العمل الأفريقي لتوفير اللقاحات (AVATT) ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا من خلال الاتحاد الأفريقي على الشريحة الأولى من لقاح كوفيد 270 مليون للقارة.
2. عقد مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا إحاطاته الصحفية الأسبوعية يوم الخميس 14 يناير 2021 الساعة 11 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. المتحدث لهذا الأسبوع كان الدكتور John Nkengasong ، مدير مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا. تسجيل هذه الجلسة الإعلامية متاحة على صفحة Africa CDC على Facebook من خلال الرابط:

<https://web.facebook.com/watch/?v=757691255074767&extid=gyiQO5GcQdC8XNaY>

3. مراكز عمليات طوارئ الصحة العامة (PHEOCs) وإدارة ندوات الكوفيد تعقد سلسلة ندوات أسبوعية وتتناول هذا الأسبوع "الدروس المستفادة من طوارئ الصحة العامة – نظرة عامة تفاعلية على الكوفيد" يوم الخميس ، 21 يناير 2021 الساعة 3 مساءً EAT. رابط التسجيل: bit.ly/3jxGzv9

الأنشطة المعملية:

1. هذا الأسبوع ، تم إجراء أكثر من 28,9 مليون اختبار لـ COVID-19 حتى الآن بمعدل إيجابي 11٪ ونسبة 8,9 اختبار لكل حالة.

الاستعداد للتعامل مع الحالات الصحية والإجراءات الطبية المضادة:

التعامل مع الحالات:

1. في الأسبوع المقبل ، ستعقد مجموعة العمل التنفيذية TWG لإدارة الحالات في Africa CDC الندوة السريرية الثامنة والثلاثين بعنوان "الوصول إلى لقاح COVID-19 وتوزيعه في إفريقيا" يوم الخميس 14 يناير 2021 الساعة 2 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. سيكون هناك أكثر من 100 مشارك في الندوة عبر الإنترنت وصفحة IWD على Facebook. يمكن الوصول إلى التسجيل هنا:

<https://www.africacdc.training/courses/ccop>

أنشطة الترصد:

1. يواصل مركز مكافحة الأمراض الأفريقي (ACDC) دعم 17 دولة من الدول الأعضاء في تنفيذ عمليات مسح الانتشار المصلي للأجسام المناعية ضد فيروس كورونا. وحالياً تقوم زامبيا وزيمبابوي بتنفيذ المسح ، بينما أنهت خمس دول أخرى المراحل التمهيديّة للمسح وهي (أوغندا، نيجيريا، بوركينا فاسو، زامبيا وملاوي).
2. يواصل مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا دعم دولتين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي (أوغندا وجنوب إفريقيا) بتنفيذ نظام ترصد الوفيات. يستمر التدريب هذا الأسبوع في أوغندا للعاملين الصحيين المجتمعيين من 10 مقاطعات.

الأنشطة العلمية والمعايير واللوائح:

1. يمكن الوصول إلى تحديث السياسة العلمية والصحية العامة لـ COVID-19 الذي يتم نشره كل أسبوعين من خلال الرابط: <https://africacdc.org/resources/> أو رابط WHO AFRO : https://afrolib.afro.who.int/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=7728

https://afrolib.afro.who.int/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=7728

2. يمكن الوصول إلى التقرير نصف الأسبوعي وجميع منتجات الشراكة الأخرى للاستجابة القائمة على الأدلة لـ COVID-19 (PERC) على كل من موقع PERC و Africa CDC website الرابط:

<https://africacdc.org/download/perc-biweekly-report-22-december-04-january-2020/>

توصيات للدول الأعضاء:

1. ينبغي على جميع الدول الأعضاء أن تواصل تعزيز ترصدها⁶ لتشمل COVID-19⁷ والتهابات الجهاز التنفسي الحادة الشديدة (SARI)⁸. يتضمن تعزيز أنشطة الترصد الأمثلة التالية:
أ. إضافة أسئلة حول السفر وتاريخ الاتصال واختبار فيروسات كورونا إلى أنظمة ترصد الإنفلونزا الحالية ؛
ب. إخطار مرافق الرعاية الصحية لإبلاغ مسؤولي الصحة العامة المحليين فورًا عن الأشخاص الذين يستوفون تعريف الحالة لـ COVID-19 و SARI و / أو سافروا مؤخرًا إلى دولة بها انتقال محلي أو سجل اتصال مع حالة.
2. يتعين على الدول الأعضاء تتبع جهات الاتصال للحالات المؤكدة بناءً على نوع الانتقال وقدرة الدولة⁹.
3. يجب على الدول الأعضاء إخطار منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض الإفريقية (ACDC) ومشاركتها بشكل روتيني فيما يتعلق بحالات COVID-19 المشتبه بها أو المؤكدة والوفيات والتعافي والاختبارات التي أجريت والعاملين في الرعاية الصحية المصابين لإبلاغ هذه التحديثات وغيرها باستمرار. ويمكن إبلاغ مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا (ACDC) عن طريق البريد الإلكتروني: AfricaCDCEBS@africa-union.org
4. يجب أن تستمر الدول الأعضاء في توجيه عامة الناس حول السعي للحصول على رعاية طبية فورية وإبلاغ مقدمي الرعاية الصحية عن تاريخ السفر أو الاتصال الحديث في أي شخص تظهر عليه أعراض مرض تنفسي حاد.
5. يجب على الدول الأعضاء أن تضع أو تعزز الإجراءات الصحية والاجتماعية الحالية حيث بدأت الحالات في الارتفاع خاصة خلال العطلة.

مصادر لمزيد من المعلومات :

مصادر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض (ACDC)

- المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض تحديثات كورونا : <https://africacdc.org/covid-19/>
- مصادر متعددة : <https://africacdc.org/covid-19-multimedia/>
- الموارد وإرشادات السياسة والرسوم البيانية : <https://africacdc.org/covid-19/covid-19-resources/>

مصادر أخرى

- المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

⁶ بروتوكول المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض لتعزيز الترصد لـ COVID-19 في إفريقيا : <https://africacdc.org/download/protocol-for-enhanced-severe-acute-respiratory-illness-and-influenza-like-illness-surveillance-for-covid-19-in-africa/>

⁷ إرشادات منظمة الصحة العالمية لترصد COVID-19 وتعريف الحالة : <https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.7>

⁸ تعريف حالة العدوى التنفسية الحادة الوخيمة لمنظمة الصحة العالمية: أي شخص مصاب بعدوى الجهاز التنفسي الحادة مع تاريخ من الحمى (أو حمى مقاسة ≤ 38 درجة مئوية) وسعال مع ظهور الأعراض في غضون الأيام العشرة الماضية التي تتطلب دخول المستشفى

https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/ili_sari_surveillance_case_definition/en/

⁹ إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا بشأن تتبع جهات الاتصال لوباء COVID-19:

<https://africacdc.org/download/guidance-on-contact-tracing-for-covid-19-pandemic/>

<https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china>

- المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19).

<https://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html>

- منظمة الصحة العالمية. التوجيه الفني.

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>

- الشراكة من أجل الاستجابة القائمة على الأدلة لـ COVID-19 (PERC)

<https://preventepidemics.org/covid19/perc/>