

تقرير تفشي المرض رقم 81: جائحة فيروس كورونا 2019 (COVID-19)

تاريخ الإصدار: 3 أغسطس 2021

198,271,475 حالة و 4,228,086 حالة وفاة

مصادر البيانات: منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي

تحديث التفشي: منذ التقرير الأخير (27 يوليو 2021)، تم الإبلاغ عن 4,154,289 حالة مؤكدة¹ جديدة بمرض فيروس الكورونا 2019 (COVID-19) و 64,860 حالة وفاة جديدة على مستوى العالم. حتى الآن، تم الإبلاغ عن إجمالي 198,271,475 حالة COVID-19 و 4,228,086 حالة وفاة ذات صلة (معدل وفيات الحالات: CFR: 2.1%) من 225 دولة ومنطقة. فيما يلي توزيع الحالات التراكمي (نسبة الحالات العالمية) من مناطق الإبلاغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية (باستثناء إفريقيا: إقليم شرق المتوسط 10,835,737 (5%) ، المنطقة الأوروبية 60,225,802 (30%) ، منطقة الأمريكتين 77,317,150 (39%) ، منطقة جنوب شرق آسيا 38,480,764 (19%) ومنطقة غرب المحيط الهادئ 4,574,460 (2%). في الأيام السبعة الماضية ، أبلغت خمس دول عن أكبر عدد من الحالات الجديدة على مستوى العالم هي الولايات المتحدة (522,332) والهند (284,696) وإندونيسيا (268,067) والبرازيل (247,321) وجمهورية إيران الإسلامية (212,087). لمزيد من المعلومات التفصيلية عن الحالات والوفيات المبلغ عنها خارج إفريقيا، يرجى الرجوع إلى لوحة معلومات COVID-19 التابعة لمنظمة الصحة العالمية.


اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا بتوقيت شرق إفريقيا (EAT) في 3 أغسطس 2021، تم الإبلاغ عن إجمالي 6,780,837 حالة COVID-19 و 171,752 حالة وفاة (CFR: %2.5) في 55 دولة هم أعضاء الاتحاد الأفريقي (AU). والذي يمثل 3% من جميع الحالات و 4% من جميع الوفيات المبلغ عنها على مستوى العالم. أبلغت أربع وعشرون دولة (44%) من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي عن تقارير إماتة أعلى من الإماتة العالمية. شهدت 54 دولة (98%) من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي موجة ثانية على الأقل، وشهدت 32 (58%) الموجة الثالثة ، وشهدت ثلاث دول (الجزائر وتونس وكينيا) موجة رابعة من COVID-19 منذ بداية الجائحة. يوضح الشكل 1 اتجاه حالات COVID-19 الجديدة التي تم الإبلاغ عنها يوميًا من قبل منطقة الاتحاد الأفريقي من 15 فبراير 2020 إلى 3 أغسطس 2021.

¹ إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن مراقبة COVID-19 وتعريف الحالة:

<https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.7>

ويظهر الاتجاه تقلبات في الأسبوعين الماضيين مع اتجاه هبوطي في الأيام القليلة الماضية الذي يتأثر بشكل رئيسي بانخفاض عدد الحالات المبلغ عنها من المنطقة الجنوبية. يتوفر المزيد من المعلومات حول حالة COVID-19 في إفريقيا على [لوحة القيادة اليومية](#) للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها و [لوحة معلومات النقاط](#)

[الساخنة](#)



الشكل 1: حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 التي تم الإبلاغ عنها يوميًا في إفريقيا من قبل منطقة الاتحاد الأفريقي ، 15 فبراير 2020 حتى 3 أغسطس 2021 .²


² التواريخ كل أسبوعين ؛ آخر موعد هو 3 أغسطس 2021

الشكل 2: متغيرات فيروس كورونا المستجد المثيرة للقلق³ المبلغ عنها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ، اعتبارًا في 28 يوليو 2021.

اعتبارًا في 28 يوليو 2021 ، أبلغت 45 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي (الشكل 2) عن وجود متغيرات جديدة ؛ 38 دولة عضو أبلغت عن ألفا ، بينما 32 دولة عضو أبلغت عن بيتا، و21 دولة عضو أبلغت عن متغير دلتا.

توفر لوحة معلومات متابعة التحورات الجينية لفيروس الكورونا 2-SARS-COV تفصيلاً لأنواع المتغيرات التي أبلغت عنها الدول الأعضاء. مزيد من المعلومات حول تسلسل SARS-COV-2 في أفريقيا متاحة على الرابط [Africa Pathogen Genomics Initiative page](https://africa.pathogen.genomics.org/)

[Initiative page](https://africa.pathogen.genomics.org/)



بالنسبة للأسبوع الوبائي الثلاثين (26 يوليو- 1 أغسطس 2021): تم الإبلاغ عن 270,293 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13% في عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع الوبائي التاسع والعشرين. غالبية حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد هذا الأسبوع من المنطقة الجنوبية (49%) ، تليها المناطق الشمالية (38%) والشرقية (7%) والغربية (5%) والوسطى (1%). هذا الأسبوع ، ست دول مسؤولة عن 72% من حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 المبلغ عنها: جنوب إفريقيا (29%)، المغرب (19%)، تونس (8%)، ليبيا (7%)، موزمبيق (5%) وبوتسوانا (5%). البلدان التي أبلغت عن أعلى معدل COVID-19 حالة جديدة لكل 100,000 نسمة) هذا الأسبوع هي بوتسوانا (546) وسيشيل (442) وليبيا (280) وإسواتيني (268) وتونس (174) والمغرب (137) وجنوب إفريقيا (132). يلخص الجدول (2) حالات وفيات COVID-19 التراكمية التي أبلغت عنها الدولة الأعضاء والمناطق المختلفة في إفريقيا وحالات COVID-19 الجديدة والوفيات التي تم الإبلاغ عنها خلال الأسبوع الوبائي الثلاثين.

³ المتغير المثير للقلق: متغير فيروس SARS-CoV-2 المرتبط بواحد أو أكثر مما يلي: زيادة قابلية الانتقال أو تغيرات في وراثيات COVID-19؛ زيادة الضراوة أو التغيير في عرض المرض السريري؛ أو انخفاض في فعالية تدابير الصحة العامة والاجتماعية أو التشخيصات واللقاحات والعلاجات المتاحة.

الجدول 2. حالات الإصابة المؤكدة COVID-19 والوفيات⁴ المبلغ عنها في إفريقيا للأسبوع الوبائي 30 (19 - 25 يوليو 2021)

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي التاسع والعشرين	عدد الوفيات (جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي التاسع والعشرين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
157%	3,155 (18)	-16%	205,657 (2,635)	المنطقة الوسطى
NA*	9 (1)	21%	7,505 (932)	بوروندي
NA*	1,334 (0)	NA*	82,064 (0)	الكاميرون
NA*	98 (0)	-38%	11,163 (18)	جمهورية إفريقيا الوسطى
NA*	174 (0)	-20%	4,973 (4)	تشاد
No change	178 (1)	-72%	13,186 (30)	الكونغو
200%	1,038 (15)	-29%	50,017 (1,514)	جمهورية الكونغو الديمقراطية
NA*	123 (0)	220%	8,911 (48)	غينيا الإستوائية
No change	164 (1)	-9%	25,384 (59)	الجابون
NA*	37 (0)	114%	2,454 (30)	ساو تومي وبرينسيبي
-13%	17,013 (349)	1%	802,092 (17,613)	المنطقة الشرقية
NA*	147 (0)	-100%	4,081 (0)	جزر القمر
NA*	156 (1)	113%	11,652 (17)	جيبوتي
-33%	35 (2)	-44%	6,547 (52)	إريتريا
75%	4,390 (21)	139%	280,565 (2,022)	أثيوبيا

⁴ يتم التحقق من البيانات باستمرار للتأكد من دقتها وموثوقيتها ومع ذلك فقد تتغير بناءً على التحديثات بأثر رجعي من الدول الأعضاء

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي التاسع والعشرين	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي التاسع والعشرين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-10%	3,946 (81)	35%	203,680 (6,271)	كينيا
367%	958 (14)	16%	42,740 (71)	مدغشقر
NA*	19 (0)	-48%	4,339 (604)	موريشيوس
-15%	821 (79)	-22%	71,326 (6,119)	رواندا
-38%	94 (5)	-14%	18,189 (442)	سيشيل
200%	813 (24)	216%	15,456 (253)	الصومال
NA*	119 (2)	NA*	11,049 (132)	جنوب السودان
NA*	2,776 (0)	-100%	37,185 (0)	السودان
-100%	29 (0)	-100%	858 (0)	تنزانيا
-33%	2,710 (120)	-14%	94,425 (1,630)	أوغندا
4%	54,917 (1,830)	47%	1,965,507 (103,506)	المنطقة الشمالية
82%	4,291 (228)	18%	172,564 (10,409)	الجزائر
No change	16,528 (41)	-11%	284,311 (287)	مصر
83%	3,579 (181)	61%	256,328 (19,367)	ليبيا
23%	567 (32)	98%	25,973 (2,218)	موريتانيا
76%	9,833 (244)	133%	629,717 (50,445)	المغرب
-17%	20,067 (1,099)	-22%	595,532 (20,530)	تونس
NA*	52 (5)	576%	1,082 (250)	الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
-12%	89,211 (3,890)	-4%	3,255,495 (132,029)	المنطقة الجنوبية
19%	1,016 (32)	6%	42,815 (1,035)	أنجولا

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي التاسع والعشرين	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي التاسع والعشرين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
7%	1,653 (168)	28%	115,220 (13,096)	بوتسوانا
15%	798 (46)	72%	26,220 (3,215)	إيسواتيني
-22%	377 (14)	85%	13,603 (723)	ليسوتو
27%	1,661 (181)	-23%	52,631 (3,994)	ملاوي
10%	1,462 (180)	22%	123,541 (13,253)	موزمبيق
-24%	3,064 (230)	-40%	119,442 (2,478)	ناميبيا
-17%	72,191 (2,416)	-5%	2,456,184 (78,361)	جنوب أفريقيا
-29%	3,406 (134)	-34%	196,293 (4,222)	زامبيا
4%	3,583 (489)	-18%	109,546 (11,652)	زيمبابوي
41%	6,928 (169)	20%	534,607 (14,510)	المنطقة الغربية
NA*	108 (1)	-13%	8,394 (70)	بنين
NA*	169 (0)	840%	13,588 (47)	بوركينافاسو
-100%	298 (0)	-11%	33,822 (245)	كابوفيردي
50%	330 (6)	73%	50,278 (686)	كوت ديفوار
-72%	213 (5)	52%	7,962 (629)	جامبيا
180%	837 (14)	-35%	104,994 (1,975)	غانا
136%	232 (26)	75%	25,914 (703)	غينيا
100%	76 (2)	79%	4,498 (286)	غينيا بيساو
NA*	148 (0)	NA*	5,459 (63)	ليبيريا
NA*	533 (3)	55%	14,587 (45)	مالي
-100%	195 (0)	46%	5,637 (38)	النيجر
240%	2,149 (17)	103%	174,315 (3,204)	نيجيريا
41%	1,367 (86)	11%	63,002 (5,739)	السنغال

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي التاسع والعشرين	عدد الوفيات (جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي التاسع والعشرين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-33%	120 (2)	40%	6,287 (59)	سيراليون
-13%	153 (7)	44%	15,870 (721)	توجو
-7%	171,224 (6,256)	13%	6,763,358 (270,293)	إجمالي

* لم يتم الإبلاغ عن حالات / وفيات جديدة في الأسبوع السابق.

تسليط الضوء على الصحة العامة والتدابير الاجتماعية:

يهدف هذا النظام إلى تسليط الضوء على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي التي تحتاج إلى الاهتمام بسبب تفشي المرض أو انتشاره. للحصول على تفاصيل حول حساب المؤشرات، راجع منهجية لوحة المعلومات. [methodology](#)

يسلط الجدول 3 أدناه الضوء على التغييرات في الصحة العامة والتدابير الاجتماعية حسب مستوى تحذير النقاط الساخنة استنادًا إلى بيانات من [Oxford COVID-19 Government Response Tracker](#)

يشير السهم المتجه لأعلى إلى الإعلان عن إجراءات اجتماعية جديدة؛ يشير السهم الأفقي إلى أنه تم تمديد الإجراءات الاجتماعية بينما يشير السهم المتجه للأسفل إلى أنه تم تخفيف / انتهاء صلاحية الإجراءات الاجتماعية. يتم تنظيم الدول الأعضاء حسب المستويات بناءً على البيانات الوبائية الحالية في الفترة من 24 يوليو إلى 30 يوليو 2021.

الجدول 3: التغييرات في الصحة العامة والتدابير الاجتماعية في الدول المختارة، 24 - 30 يوليو 2021

الدولة	اتجاه الإجراءات	التغيير في الإجراءات الاجتماعية
المستوى 4 (تنبيه مرتفع): معدل الإصابة اليومي لكل مليون شخص / يوم ≥ 80 و / أو معدل إيجابية $\geq 12\%$		
ليبيا	↑	فرض المسؤولون في ليبيا حظر تجول ليلا في جميع أنحاء البلاد، من الساعة 06:00 مساءً إلى الساعة 06:00 صباحاً، والذي فرضه الجيش حالياً.
المغرب	→ / ↑	مدد المغرب حالة الطوارئ الصحية على مستوى البلاد حتى 10 سبتمبر. كما تم إغلاق مدينة الدار البيضاء، بما في ذلك حظر تجول ليلا وإغلاق المدارس.
جنوب إفريقيا	↑	تم رفع بعض القيود لمنع انتشار COVID-19 في جنوب إفريقيا، بما في ذلك الحظر المفروض على بيع الكحول والقيود المفروضة على التنقل بين المقاطعات. لا تزال التدابير الأخرى - بما في ذلك فرض القناع في الأماكن العامة - سارية.

زيمبابوي	↓	على الرغم من استمرار إجراءات الإغلاق الأخرى على مستوى البلاد ، فإن زيمبابوي <u>تعيد فتح</u> بعض مناطق الجذب السياحي للزوار الذين تم تطعيمهم ، بما في ذلك شلالات فيكتوريا الشهيرة.
المستوى 3 (تنبيه متوسط): معدل حدوث الحالة اليومية لكل مليون شخص / يوم هو 20 إلى >80 و / أو معدل الإيجابية هو 5% إلى >12%		
الجزائر	↑	تم <u>تمديد</u> حظر التجول الليلي في الجزائر لمدة 5 ساعات (من الساعة 20:00 إلى الساعة 6:00 ، سابقاً من الساعة 11:00 مساءً إلى الساعة 4:00 صباحاً) وفرض قيوداً إضافية ، بما في ذلك إغلاق الصالات الرياضية والشواطئ وخدمة تناول الطعام في الخارج فقط في المطاعم والمقاهي.
كابو فيردي	↓	<u>سمحت</u> السلطات في كابو فيردي بانتهاء حالة الكارثة على مستوى البلاد نظرًا للوضع الوبائي الحالي في البلاد. سيتم رفع القيود المفروضة على الأنشطة والتجمعات للأشخاص الذين يمكنهم إظهار دليل على التطعيم.
ليسوتو	↑	<u>رفعت</u> ليسوتو مستوى التأهب على مستوى البلاد من اللون الأزرق إلى اللون الأرجواني. وتشمل الإجراءات بموجب هذا الأمر حظر التجول ليلاً ، وقيود السعة على الخدمات الدينية ، وحظر التجمعات الاجتماعية العامة والخاصة.
موريتانيا	↑	مددت السلطات في موريتانيا حظر التجول الليلي في جميع أنحاء البلاد لمدة ساعتين ، من 10:00 مساءً إلى 6:00 صباحاً
المستوى 2 (تنبيه منخفض): معدل حدوث الحالة اليومية لكل مليون شخص / يوم هو من 5 إلى أقل من 20 و / أو معدل الإيجابية هو 3% إلى 5%		
غانا	↑	<u>فرض</u> المسؤولون في غانا بعض القيود على بعض التجمعات العامة ، بما في ذلك القيود الزمنية على الجنازات و <u>حظر</u> حفلات الاستقبال بعد الزفاف.
غينيا بيساو	→	<u>مددت</u> غينيا بيساو حالة التأهب على مستوى البلاد حتى 8 أغسطس. وتشمل التدابير قيود السعة على الأحداث الاجتماعية والثقافية (بما في ذلك الجنازات) ، والإغلاق المستمر للصالات الرياضية والنوادي الليلية ، وفرض غطاء الوجه في الأماكن العامة.
المستوى 1 (الاحتياطات القياسية): معدل حدوث الحالة اليومية لكل مليون شخص / يوم أقل من 5 و / أو معدل الإيجابية أقل من 3%		
الكونغو	↑/→	<u>حظرت</u> الكونغو الرحلات الجوية من جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة بسبب مخاوف بشأن تداول متحور دلتا. كما <u>مددت</u> السلطات في الكونغو حالة الطوارئ الصحية على مستوى البلاد حتى 13 أغسطس.

مددت مدغشقر حالة الطوارئ الصحية على مستوى البلاد لمدة 15 يومًا إضافية. وتشمل التدابير حظر التجول ليلا في مناطق محددة ذات معدل انتقال أعلى ، فضلا عن ولاية تتطلب استخدام أقنعة الوجه في الأماكن العامة.	→	مدغشقر
--	---	--------

أنشطة الاستجابة الجديدة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا (ACDC): الأنشطة العامة:

1. الأسبوع الماضي استضاف الدكتور جون نكينجاسونج مدير المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، المؤتمر الصحي الأسبوعي لمركز مكافحة الأمراض في أفريقيا يوم الخميس 29 يوليو 2021. وانضم إليه الدكتور ماتشيديسو موي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا لمناقشة COVID-19 وضع اللقاحات في القارة ، وتوزيع جرعات اللقاح التي تبرعت بها الولايات المتحدة على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ، ومبادرة تصنيع اللقاحات في إفريقيا، والموجات الثالثة والرابعة، بالإضافة إلى متغيرات COVID-19 المثيرة للقلق. التسجيل متاح على صفحة صفحة [Africa CDC Twitter](#).
2. التقى فريق المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها مع سعادة د. سامية سولو حسن ، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة يوم الخميس 27 يوليو 2021 لمناقشة مجالات التعاون للاستجابة لـ COVID-19 في تنزانيا.
3. سيعقد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها ندوة عبر الإنترنت حول التعلم عبر البلاد لتعزيز نظام الصحة المجتمعية. سيشارك في استضافة الندوة عبر الإنترنت الدكتور جون نكينغاسونغ ، مدير مركز السيطرة على الأمراض في أفريقيا وصاحبة السعادة إلين سيرليف جونسون ، الرئيسة السابقة لليبريا لمناقشة تنفيذ الشراكة لتسريع مبادرة اختبار COVID-19 (PACT) وتبادل الخبرات من قبل ممثلين من ست دول أعضاء في الاتحاد الأفريقي. ستعقد الندوة عبر الإنترنت في الفترة من 3 إلى 4 أغسطس 2021 الساعة 2 ظهرًا. [سجل هنا](#)
4. اعتبارًا في 2 أغسطس 2021 ، بدأت 53 (96%) من أصل 55 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي حملات تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (COVID-19) التي تستهدف السكان ذوي الأولوية. بشكل تراكمي ، تم إعطاء أكثر من 68.3 مليون جرعة، مما يغطي 2.7 % من سكان القارة. ومن بين الجرعات التي تم تناولها ، تلقت 48.3 مليون جرعة أولى وتلقت 19.9 مليون جرعة ثانية. إريتريا وبوروندي هما الدولتان العضويتان في الاتحاد الأفريقي اللذان لم يبدأ بعد إطلاق لقاح COVID-19. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول لقاح COVID-19 على لوحة معلومات لقاح COVID-19 [على لوحة معلومات لقاح. COVID-19 Africa CDC](#).

الأنشطة العملية:

1. تم إجراء أكثر من 59.4 مليون اختبار لـ COVID-19 في إفريقيا منذ فبراير 2020. بلغ معدل الإيجابية التراكمية ونسبة الاختبار لكل حالة 11% و 9 على التوالي. بالنسبة للأسبوع الوبائي الثلاثون، تم إجراء ما مجموعه 1,373,495 اختبارًا جديدًا، بانخفاض قدره 4% مقارنة بالأسبوع الوبائي التاسع والعشرين حيث تم إجراء 1,318,499 اختبارًا.
2. نظم المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، بالتعاون مع Global Health System Solutions (GHSS)، تدريبًا متدرجًا على اختبار المستضدات لـ 89 مشاركًا في الكونغو برازافيل في الفترة 26-29 يوليو 2021.
3. سيدعم مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا تدريجيًا على اختبار المستضدات للمشاركين في بوركينافاسو وتشاد في الفترة 30-27 أغسطس 2021.

الاستعداد للرعاية الصحية والإجراءات الطبية المضادة:

مكافحة العدوى والسيطرة

1. أجرى المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها تدريبًا مشتركًا مع منظمة الصحة العالمية في إفريقيا حول الوقاية من عدوى فيروس كورونا ومكافحتها؛ ألقى الاجتماع الضوء على معالجة عودة الظهور في أوغندا ورواندا وزامبيا وموزمبيق بالتعاون مع اليونيسف / مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، والخدمة التطوعية في الخارج (VSO) والعمل ضد الجوع في 28-30 يوليو 2021. وتم تدريب ما مجموعه 700 مشارك.
2. سيعقد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها الجلسة الثالثة من سلسلة ندوات مكافحة العدوى والوقاية منها الثامنة عبر الإنترنت بعنوان "تعزيز برامج مكافحة العدوى للوقاية من تفشي الأمراض" يوم الأربعاء 4 أغسطس 2021 في تمام الساعة الواحدة ظهرًا. لجلسة اللغة الإنجليزية. [سجل هنا](#).
3. سيعقد مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا الجلسة الثانية من سلسلة ندوات مكافحة العدوى والوقاية منها الثامنة عبر الإنترنت بعنوان "تعزيز برامج مكافحة العدوى للوقاية من تفشي الأمراض" باللغة الفرنسية في 5 أغسطس 2021 في الساعة 2 ظهرًا. [سجل هنا](#).

الأنشطة العلمية والمعايير واللوائح:

1. قم بالوصول إلى تحديث سياسة الصحة العامة والعلمية لـ COVID-19 كل أسبوعين [هنا](#).
2. اشترك [هنا](#) لتلقي التحديث الأسبوعي للشراكة من أجل الاستجابة المستندة إلى الأدلة لـ COVID-19 (PERC) وجميع المنتجات الأخرى أو قم بزيارة موقع [PERC](#) و [Africa CDC website](#).

توصيات للدول الأعضاء:

1. ينبغي على جميع الدول الأعضاء أن تواصل تعزيز ترصدها COVID-19⁵ لتشمل:
أ. ترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا الشبيهة بالأمراض (ILI) والتهابات الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (SARI)⁶.
ب. ترصد الوفيات السريع الذي يشمل جمع وتحليل واستخدام معطيات الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب التي تم جمعها من خلال الترصد المرتكز على المرافق الصحية أو المجتمع⁷.
ج. الترصد الجيني⁸ لمراقبة وجود المتغير (الفيروس المتحور) وانتشاره وكذلك التطور المستمر للفيروس.
2. يتعين على الدول الأعضاء أن تستمر في إجراء تتبع⁹ المخالطين للحالات المؤكدة بناءً على نوع الانتقال وقدرة البلد وتعزيز جهود الفحص التشخيصي باستخدام اختبارات المستضدات السريعة¹⁰.
3. يجب على الدول الأعضاء إخطار وتبادل البيانات بشكل روتيني فيما يتعلق بحالات COVID-19 المؤكدة والوفيات والتعافي والاختبارات التي أجريت والعاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بمنظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة

⁵ منظمة الصحة العالمية تعرف حالة COVID-19

⁶ بروتوكول المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتحسين المراقبة لـ COVID-19 في إفريقيا: بروتوكول لتعزيز أمراض الجهاز التنفسي الحادة الشديدة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا لـ COVID-19 في إفريقيا - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

⁷ الكشف عن حصيلة COVID-19: حزمة فنية للدول الأعضاء - المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها

⁸ التسلسل الجيني لـ SARS-CoV-2: دليل للتنفيذ لتحقيق أقصى تأثير على الصحة العامة

⁹ إرشادات مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا حول تتبع جهات الاتصال لوباء COVID-19

<https://africacdc.org/download/guidance-on-contact-tracing-for-covid-19-pandemic/>

¹⁰ إرشادات مؤقتة حول استخدام اختبارات المستضد السريع للاستجابة لـ COVID-19 - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

- الأمراض في إفريقيا لإبلاغ هذه التحديثات وغيرها باستمرار. أبلغ مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا عن طريق البريد الإلكتروني: AfricaCDCEBS@africa-union.org
4. يجب أن تستمر الدول الأعضاء في إرشاد عامة الناس بشأن السعي للحصول على رعاية طبية فورية لأولئك الذين تظهر عليهم أعراض حادة (مثل صعوبة التنفس).
5. يجب على الدول الأعضاء أن تضع أو تعزز التدابير الصحية العامة والاجتماعية القائمة عندما تبدأ الحالات في الارتفاع.

مصادر لمزيد من المعلومات :

مصادر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض (ACDC)

- <https://africacdc.org/COVID-19/> : المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض تحديثات كورونا
- <https://africacdc.org/COVID-19/COVID-19-resources/> : الموارد وإرشادات السياسة والرسوم البيانية
- منظمة الصحة العالمية. التوجيه الفني.
<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>
- الشراكة من أجل الاستجابة القائمة على الأدلة لـ (COVID-19 PERC)
<https://preventepidemics.org/covid19/perc/>