

تقرير تفشي المرض رقم 83 : جائحة فيروس كورونا 2019 (COVID-19)

تاريخ الإصدار: 17 أغسطس 2021

207,218,563 حالة و 4,362,968 حالة وفاة


مصادر البيانات: منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي

تحديث التفشي: منذ التقرير الأخير (10 أغسطس 2021)، تم الإبلاغ عن 4,556,501 حالة مؤكدة¹ جديدة بمرض فيروس الكورونا 2019 (COVID-19) و 68,634 حالة وفاة جديدة على مستوى العالم. حتى الآن، تم الإبلاغ عن إجمالي 207,218,563 حالة COVID-19 و 4,362,968 حالة وفاة ذات صلة (معدل وفيات الحالات: 2.1% CFR) من 225 دولة ومنطقة. فيما يلي توزيع الحالات التراكمي (نسبة الحالات العالمية) من مناطق الإبلاغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية (باستثناء إفريقيا: إقليم شرق المتوسط (6% 11,648,839 ، المنطقة الأوروبية (30% 62,600,959 ، منطقة الأمريكتين (39% 80,203,540 ، منطقة جنوب شرق آسيا (19% 39,992,613 ومنطقة غرب المحيط الهادئ (3% 5,394,531. في الأيام السبعة الماضية ، أبلغت خمس دول عن أكبر عدد من الحالات الجديدة على مستوى العالم هي الولايات المتحدة (778,272) وجمهورية إيران الإسلامية (267,092) والهند (255,559) والبرازيل (198,363) والمملكة المتحدة (198,075) ، لمزيد من المعلومات التفصيلية عن الحالات والوفيات المبلغ عنها خارج إفريقيا ، يرجى الرجوع إلى لوحة معلومات COVID-19 التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا بتوقيت شرق إفريقيا (EAT) في 17 أغسطس 2021، تم الإبلاغ عن إجمالي 7,314,632 حالة COVID-19 و 184,565 حالة وفاة (CFR: %2.5) في 55 دولة هم أعضاء الاتحاد الأفريقي (AU). والذي يمثل 3.5% من جميع الحالات و 4.2% من جميع الوفيات المبلغ عنها على مستوى العالم. أبلغت أثنان وعشرون دولة (40%) من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي عن تقارير إمامة أعلى من الإمامة العالمية. شهدت 36 (65%) موجة ثالثة ، وشهدت أربع دول (الجزائر ، وكينيا ، والصومال ، وتونس) موجة رابعة من حالات COVID-19 منذ بداية الوباء. يوضح الشكل 1 اتجاه حالات COVID-19 الجديدة التي يتم الإبلاغ عنها يوميًا من قبل منطقة الاتحاد الأفريقي من 15 فبراير 2020 إلى 17 أغسطس 2021. بشكل عام ، هناك اتجاه تنازلي في عدد الحالات الجديدة التي يتم الإبلاغ عنها يوميًا ولا يزال هذا يتأثر بانخفاض الأرقام المبلغ عنها من المنطقة الجنوبية.

¹ إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن مراقبة COVID-19 وتعريف الحالة:

مزيد من المعلومات حول حالة COVID-19 في إفريقيا على [لوحة القيادة اليومية](#) للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها و [لوحة معلومات النقاط الساخنة](#)



الشكل 1: حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 التي تم الإبلاغ عنها يوميًا في إفريقيا من قبل منطقة الاتحاد الأفريقي ، 15 فبراير 2020 حتى 17 أغسطس 2021 .²

اعتبارًا في 17 أغسطس 2021 ، أبلغت 51 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي (الشكل 2) عن وجود متغيرات جديدة ؛ 42 دولة عضو أبلغت عن ألفا، بينما 37 دولة عضو أبلغت عن بيتا، و30 دولة عضو أبلغت عن متغير دلتا بينما أبلغت دولة واحدة عن متغير جاما³.

² التواريخ كل أسبوعين ؛ آخر موعد هو 10 أغسطس 2021
³ أبلغ السودان عن غير قصد عن وجود غاما المركبات العضوية المتطايرة. الرقم الصحيح مدرج الآن.

توفر لوحة معلومات متابعة التحورات الجينية لفيروس الكورونا SARS-COV-2 تفصيلاً لأنواع المتغيرات التي أبلغت عنها الدول الأعضاء. مزيد من المعلومات حول تسلسل SARS-COV-2 في أفريقيا متاحة على الرابط [Africa Pathogen Genomics Initiative page](#)

بالنسبة للأسبوع الوبائي الثاني والثلاثين (9 - 15 أغسطس 2021): تم الإبلاغ عن 242,041 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 11% في عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع الوبائي الواحد والثلاثين. غالبية حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد هذا الأسبوع من المنطقة الجنوبية (44%) من حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 المبلغ عنها هذا الأسبوع، تليها المناطق الشمالية (41%) والشرقية (9%) والغربية (6%) والوسطى (1%). هذا الأسبوع، استحوذت سبع دول على 79% من حالات COVID-19 الجديدة المبلغ عنها: جنوب إفريقيا (30%)، المغرب (26%)، ليبيا (6%)، تونس (5%)، بوتسوانا (5%)، كينيا (4%)، وموزمبيق (3%). البلدان التي أبلغت عن أعلى معدل (COVID-19) حالة جديدة لكل 100,000 نسمة) هذا الأسبوع هي بوتسوانا (484)، إيسواتيني (412)، سيشيل (399)، ليبيا (214)، المغرب (171)، جنوب أفريقيا (122)، وتونس (101). يلخص الجدول 2 حالات COVID-19 التراكمية والوفيات التي أبلغت عنها الدولة العضو والمنطقة في إفريقيا وحالات COVID-19 الجديدة والوفيات التي تم الإبلاغ عنها خلال الأسبوع الوبائي الثاني والثلاثون.

الجدول 2. حالات الإصابة المؤكدة COVID-19 والوفيات⁴ المبلغ عنها في إفريقيا للأسبوع الوبائي 32 (9 - 15 أغسطس 2021)

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الحادي والثلاثين	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الحادي والثلاثين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-87%	3,175 (2)	0%	212,569 (2,986)	المنطقة الوسطى
-100%	10 (0)	123%	10,103 (1,303)	بوروندي
-100%	1,338 (0)	-100%	82,454 (0)	الكاميرون
-100%	99 (0)	-32%	11,262 (36)	جمهورية إفريقيا الوسطى

⁴ يتم التحقق من البيانات باستمرار للتأكد من دقتها وموثوقيتها ومع ذلك فقد تتغير بناءً على التحديثات بأثر رجعي من الدول الأعضاء

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الحادي والثلاثين	عدد الوفيات (جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الحادي والثلاثين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
NA*	174 (0)	-20%	4,982 (4)	تشاد
-100%	179 (0)	NA*	13,398 (141)	الكونغو
-80%	1,050 (2)	-31%	53,346 (1,361)	جمهورية الكونغو الديمقراطية
NA*	123 (0)	-48%	8,972 (21)	غينيا الإستوائية
-100%	165 (0)	31%	25,564 (102)	الجابون
NA*	37 (0)	13%	2,488 (18)	ساو تومي وبرينسيبي
-1%	17,945 (457)	5%	859,027 (20,875)	المنطقة الشرقية
NA*	147 (0)	NA*	4,081 (0)	جزر القمر
NA*	156 (0)	100%	11,682 (20)	جيبوتي
NA*	37 (2)	-14%	6,601 (25)	إريتريا
44%	4,478 (52)	47%	289,274 (5,183)	أثيوبيا
-6%	4,340 (191)	9%	220,727 (8,899)	كينيا
NA*	961 (3)	-7%	42,819 (38)	مدغشقر
NA*	21 (2)	53%	6,166 (1,104)	موريشيوس
No change	959 (69)	-24%	79,692 (3,621)	رواندا
NA*	98 (4)	2%	18,981 (399)	سيشيل
-11%	883 (33)	11%	16,319 (454)	الصومال
-100%	120 (0)	41%	11,172 (72)	جنوب السودان
-63%	2,813 (10)	-92%	37,556 (28)	السودان
NA*	50 (21)	NA*	16,970 (0)	تنزانيا

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الحادي والثلاثين	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الحادي والثلاثين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-20%	2,882 (70)	-27%	96,987 (1,032)	أوغندا
6%	58,967 (2,003)	-10%	2,173,959 (98,406)	المنطقة الشمالية
-6%	4,794 (244)	-33%	187,258 (5,882)	الجزائر
-6%	16,619 (44)	65%	285,358 (652)	مصر
7%	3,933 (183)	9%	284,618 (14,771)	ليبيا
-18%	636 (31)	-13%	30,121 (1,924)	موريتانيا
36%	11,017 (682)	-5%	759,456 (63,174)	المغرب
-5%	21,905 (816)	-30%	625,688 (11,862)	تونس
-63%	63 (3)	-41%	1,460 (141)	الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
-13%	96,222 (3,262)	-14%	3,484,560 (105,807)	المنطقة الجنوبية
111%	1,100 (57)	13%	44,617 (955)	أنجولا
18%	2,043 (211)	-25%	142,380 (11,609)	بوتسوانا
16%	934 (73)	2%	36,008 (4,948)	إيسواتيني
-46%	397 (7)	67%	14,243 (400)	ليسوتو
-16%	1,968 (140)	-34%	58,083 (2,163)	ملاوي
-32%	1,716 (103)	-29%	138,749 (6,297)	موزمبيق
-33%	3,285 (89)	-24%	122,545 (1,342)	ناميبيا
-11%	77,141 (2,328)	-7%	2,605,586 (72,120)	جنوب أفريقيا
-42%	3,529 (45)	-41%	202,261 (2,212)	زامبيا
-34%	4,109 (209)	-45%	120,088 (3,761)	زيمبابوي

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الحادي والثلاثين	عدد الوفيات (جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الحادي والثلاثين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
25%	7,582 (345)	-13%	566,442 (13,967)	المنطقة الغربية
50%	113 (3)	114%	9,065 (457)	بنين
NA*	170 (1)	64%	13,675 (54)	بوركينافاسو
NA*	300 (2)	180%	34,407 (431)	كابوفيردي
64%	359 (18)	-25%	52,202 (822)	كوت ديفوار
-17%	271 (20)	-56%	9,195 (275)	جامبيا
-31%	930 (31)	-40%	111,232 (1,804)	غانا
No change	292 (29)	-10%	28,118 (1,006)	غينيا
267%	90 (11)	16%	5,123 (335)	غينيا بيساو
NA*	221 (73)	NA*	5,482 (23)	ليبيريا
No change	535 (1)	-4%	14,695 (53)	مالي
-100%	196 (0)	-26%	5,724 (37)	النيجر
-16%	2,219 (32)	17%	182,503 (4,417)	نيجيريا
3%	1,600 (118)	-32%	70,679 (3,100)	السنغال
-100%	121 (0)	-4%	6,342 (27)	سيراليون
No change	165 (6)	12%	18,000 (1,126)	توجو
-5%	183,891 (6,069)	-11%	7,296,557 (242,041)	إجمالي

* لم يتم الإبلاغ عن حالات / وفيات جديدة في الأسبوع السابق.

تسليط الضوء على الصحة العامة والتدابير الاجتماعية:

يهدف هذا النظام إلى تسليط الضوء على الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي التي تحتاج إلى الاهتمام بسبب تفشي المرض أو انتشاره. للحصول على تفاصيل حول حساب المؤشرات، راجع منهجية لوحة المعلومات [methodology](#).

يسلط الجدول 3 أدناه الضوء على التغييرات في الصحة العامة والتدابير

الاجتماعية حسب مستوى تحذير النقاط الساخنة استنادًا إلى بيانات من [Oxford COVID-19 Government Response Tracker](#)

يشير السهم المتجه لأعلى إلى الإعلان عن إجراءات اجتماعية جديدة ؛ يشير السهم الأفقي إلى أنه تم تمديد الإجراءات الاجتماعية بينما يشير السهم المتجه للأسفل إلى أنه تم تخفيف / انتهاء صلاحية الإجراءات الاجتماعية. يتم تنظيم الدول الأعضاء حسب المستويات بناءً على البيانات الوبائية الحالية في الفترة من 7 إلى 13 أغسطس 2021 .

الجدول 3: التغييرات في الصحة العامة والتدابير الاجتماعية في الدول المختارة، 7 - 13 أغسطس 2021

الدولة	اتجاه الإجراءات	التغيير في الإجراءات الاجتماعية
المستوى 4 (تنبه مرتفع): معدل الإصابة اليومي لكل مليون شخص / يوم ≥ 80 و / أو معدل إيجابية $\geq 12\%$		
ليبيا	↓	<u>انتهى</u> الإغلاق لمدة ثلاثة أيام في ليبيا ، لكن السلطات فرضت حظر تجول ليليًا من الساعة 18:00 إلى الساعة 06:00 لمكافحة انتقال COVID-19. كما تم <u>إغلاق</u> الحدود مع تونس لمدة أسبوع أمام تزايد الحالات.
المغرب	→	<u>مددت</u> السلطات المغربية حالة الطوارئ الصحية حتى 10 سبتمبر، لكنها رفعت بعض القيود المفروضة على الأفراد الذين حصلوا على لقاحات كاملة، بما في ذلك حظر التجول ليلا وحظر السفر بين الولايات.
ناميبيا	↓	<u>خففت</u> ناميبيا بعض تدابير COVID-19، بما في ذلك زيادة حدود السعة للتجمعات العامة من 50 إلى 100 شخص، وإعادة فتح بعض الشركات بما في ذلك النوادي الليلية وصالات الألعاب الرياضية (مع قيود)، واستئناف الرياضات الاحتكاكية مع عدم وجود متفرجين. ولا تزال التدابير الأخرى، بما في ذلك حظر التجول ليلا، سارية حتى 14 سبتمبر / أيلول.
زيمبابوي	→	تم <u>تمديد</u> إجراءات الإغلاق من المستوى الرابع في زيمبابوي وسط الارتفاع المستمر في انتقال COVID-19. وتشمل الإجراءات إغلاق المدارس، وحظر التجول ليلا في جميع أنحاء البلاد، وحظر السفر غير الضروري بين المدن. كما أعلنت الحكومة أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم يمكن أن يعودوا إلى الشعائر الدينية.
تونس	↓	تم <u>تقصير</u> حظر التجول الليلي في تونس بساعتين اعتبارًا من 1 أغسطس.
المستوى 3 (تنبه متوسط): معدل حدوث الحالة اليومية لكل مليون شخص / يوم هو 20 إلى > 80 و / أو معدل الإيجابية هو $> 12\%$		
أنجولا	↓	<u>يُسمح بإعادة</u> فتح الكازينوهات وغرف الألعاب في أنجولا مع بعض القيود على السعة وساعات العمل.

الدولة	اتجاه الإجراءات	التغيير في الإجراءات الاجتماعية
رواندا	↓	<u>خففت</u> السلطات في رواندا بعض القيود المفروضة بشأن فيروس كورونا. تم تخفيض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد لمدة ساعتين، ويسمح بتناول الطعام في أماكن العمل في المطاعم والمقاهي، وأعيد فتح الصالات الرياضية، وزادت حدود السعة على وسائل النقل العام إلى 75٪، ويسمح بمراسم الزواج بحضور 50 شخصًا.
المستوى 2 (تنبيه منخفض): معدل حدوث الحالة اليومية لكل مليون شخص / يوم هو من 5 إلى أقل من 20 و / أو معدل الإيجابية هو 3٪ إلى 5٪		
كوت ديفوار	→	تم <u>تمديد</u> حالة الطوارئ الصحية في كوت ديفوار حتى 30 سبتمبر على الأقل. لم يتم إدخال أي تدابير جديدة، ولكن تم الإبقاء على القيود المفروضة على المسافرين الدوليين وإنفاذ تدابير الحماية الفردية في الأماكن العامة (ارتداء قناع الوجه، والتباعد الاجتماعي).
غينيا	↑	<u>شدت</u> غينيا بعض تدابير COVID-19 من الحالات المتزايدة. تم إغلاق الحانات وأماكن الترفيه، وتم توسيع حظر التجول الليلي ليشمل الأمة بأكملها، ويطلب الآن من موظفي الخدمة المدنية تقديم تصريح صحي للوصول إلى مكاتبهم.
غينيا بيساو	→	<u>أعلنت</u> السلطات في غينيا بيساو حالة الكارثة وسط ارتفاع حالات الإصابة بـ COVID-19 حتى 8 سبتمبر على الأقل. لم يتم فرض أي تدابير جديدة، ولكن يتم الاحتفاظ بتفويض القناع لجميع الأشخاص في الأماكن العامة.
المستوى 1 (الاحتياطات القياسية): معدل حدوث الحالة اليومية لكل مليون شخص / يوم أقل من 5 و / أو معدل الإيجابية أقل من 3٪		
الكونغو	→	<u>مددت</u> الكونغو حالة الأمن الصحي على مستوى البلاد حتى 4 سبتمبر على الأقل. تشمل الإجراءات المستمرة قيودًا على التجمعات العامة لثلاثة أشخاص فقط، وحظر تجول ليلي في المناطق الساخنة في برازافيل وبوانت نوار، وإغلاق النوادي الليلية.
مدغشقر	→	<u>يمدد</u> المسؤولون في مدغشقر حالة الطوارئ الصحية المتعلقة بـ COVID-19 حتى 23 أغسطس، لكنهم رفعوا بعض القيود الأخرى، بما في ذلك حظر التجول الليلي، وسمحوا لبعض الشركات بإعادة فتحها، بما في ذلك النوادي الليلية. لا يزال الحظر ساري المفعول على التجمعات التي تضم 400 شخص أو أكثر.

أنشطة الاستجابة الجديدة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا (ACDC):
الأنشطة العامة:

1. الأسبوع الماضي استضاف الدكتور جون نكينجاسونج مدير المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، المؤتمر الصحفي الأسبوعي الحادي والسبعين لمراكز السيطرة على الأمراض في إفريقيا يوم الخميس 12 أغسطس 2021. التسجيل متاح على صفحة [Africa CDC Twitter](https://twitter.com/AfricaCDC).

2. خلال الإحاطة الأسبوعية الحادية والسبعين حول COVID-19، أعلن الدكتور جون نكينجاسونج ، مدير المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، عن المؤتمر الدولي الأول للصحة العامة في إفريقيا [International Conference on Public Health in Africa](https://cphia2021.com/)
3. سيوفر المؤتمر منصة للباحثين الأفارقة وصانعي السياسات وأصحاب المصلحة لتبادل النتائج العلمية ووجهات نظر الصحة العامة والتعاون في البحث والابتكار والصحة العامة في جميع أنحاء القارة. التسجيل مفتوح الآن: <https://cphia2021.com/>
4. تواصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي تلقي أول مخصصات لها من لقاحات جونسون آند جونسون من خلال مبادرة AVAT. في الأسبوع الماضي، تلقت أنجولا (165,600)، وبوتسوانا (108,000)، وموريشيوس (108,000)، ونيجيريا (177,600) وتونس (108,000) شحناتهم الأولى من لقاح جونسون آند جونسون ذو الجرعة الواحدة. بشكل عام، تم تسليم 1,490,400 جرعة لقاح في عشرة بلدان.
5. قدمت الوكالة الأفريقية للتأمين التجاري (ATI) دعمًا ماليًا قدره 250,000 دولار أمريكي المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها. ستساعد المساهمة جهود وكالة الصحة العامة لسد الفجوة في التطعيم ضد COVID-19 في جميع أنحاء إفريقيا.
6. تلقت Africa CDC 2.9 مليون قناع 95N من الحكومة الكندية.
7. اعتبارًا من 16 أغسطس 2021 ، بدأت 53 (96٪) من أصل 55 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي حملات تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (COVID-19) التي تستهدف السكان ذوي الأولوية. بشكل تراكمي ، تم إعطاء أكثر من 83.9 مليون جرعة ، مما يوفر تغطية بنسبة 2.9 ٪ من سكان القارة. ومن بين الجرعات التي تم تناولها ، حصل 59.7 مليون على الجرعة الأولى ، وتلقى 24.2 مليون جرعة ثانية. إريتريا وبوروندي هما الدولتين العضوين في الاتحاد الإفريقي التي لم تبدأ بعد إطلاق لقاح COVID-19. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول لقاح COVID-19 على [Africa CDC COVID-19 dashboard](https://cphia2021.com/)

الأنشطة المعملية:

1. تم إجراء أكثر من 63 مليون اختبار لـ COVID-19 في إفريقيا منذ فبراير 2020. بلغ معدل الإيجابية⁵ التراكمية ونسبة⁶ الاختبار لكل حالة 11.6٪ و 9 على التوالي. بالنسبة للأسبوع الوبائي الثاني والثلاثين، تم إجراء ما مجموعه 1,517,446 اختبارًا جديدًا، بزيادة قدرها 7٪ مقارنة بالأسبوع الوبائي الحادي والثلاثين حيث تم إجراء 1,421,899 اختبارًا.

⁵ [Public health criteria to adjust public health and social measures in the context of COVID-19](https://cphia2021.com/)

⁶ حددت منظمة الصحة العالمية 10-30 اختبارًا لكل حالة مؤكدة كمييار عام للاختبار المناسب.

الاستعداد للرعاية الصحية والإجراءات الطبية المضادة:

مكافحة العدوى والسيطرة

1. عقد المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها الجلسة الرابعة من سلسلة ندوات IPC الثمانية بعنوان " IPC WASH - في مرافق الرعاية الصحية" يوم الأربعاء 11 أغسطس 2021 وحضرها 798 مشاركًا. يمكن الوصول إلى تسجيل الندوة على صفحة [Twitter CDC Africa](#).
2. عقدت Africa CDC الجلسة الفرنسية للدورة الرابعة من سلسلة ندوات IPC الثامنة عبر الإنترنت بعنوان "مياه الصرف الصحي والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحية" وحضرها 146 مشاركًا يوم الخميس 12 أغسطس 2021.
3. ستستمر الجلسة الرابعة من سلسلة ندوات IPC الثامنة على الإنترنت "مياه الصرف الصحي والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحية" يوم الأربعاء 18 أغسطس 2021 في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت شرق أفريقيا. للجلسة الإنجليزية [سجل هنا](#).
4. ستستمر الجلسة الرابعة من سلسلة ندوات مكافحة العدوى الثمانية بعنوان "مياه الصرف الصحي والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحية" يوم الخميس 12 أغسطس 2021 للجلسة الفرنسية. [سجل هنا](#).

الأنشطة العلمية والمعايير واللوائح:

1. قم بالوصول إلى تحديث سياسة الصحة العامة والعلمية لـ COVID-19 كل أسبوعين [هنا](#).
2. اشترك [هنا](#) لتلقي التحديث الأسبوعي للشراكة من أجل الاستجابة المستندة إلى الأدلة لـ COVID-19 (PERC) وجميع المنتجات الأخرى أو قم بزيارة موقع [PERC](#) و [Africa CDC website](#).

توصيات للدول الأعضاء:

1. ينبغي على جميع الدول الأعضاء أن تواصل تعزيز ترصدها لـ COVID-19 لتشمل:
أ. ترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا الشبيهة بالأمراض (ILI) والتهابات الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (SARI).⁸
ب. ترصد الوفيات السريع الذي يشمل جمع وتحليل واستخدام معطيات الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب التي تم جمعها من خلال الترصد المرتكز على المرافق الصحية أو المجتمع.⁹
ج. الترصد الجيني¹⁰ لمراقبة وجود المتغير (الفيروس المتحور) وانتشاره وكذلك التطور المستمر للفيروس.
2. يتعين على الدول الأعضاء أن تستمر في إجراء تتبع¹¹ المخالطين للحالات المؤكدة بناءً على نوع الانتقال وقدرة البلد وتعزيز جهود الفحص التشخيصي باستخدام اختبارات المستضدات السريعة¹².

⁷ منظمة الصحة العالمية تعريف حالة COVID-19

⁸ بروتوكول المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتحسين المراقبة لـ COVID-19 في إفريقيا: بروتوكول لتعزيز أمراض الجهاز التنفسي

الحادة الشديدة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا لـ COVID-19 في إفريقيا - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

⁹ الكشف عن حصيلة COVID-19: حزمة فنية للدول الأعضاء - المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها

¹⁰ التسلسل الجيني لـ SARS-CoV-2: دليل للتنفيذ لتحقيق أقصى تأثير على الصحة العامة

¹¹ إرشادات مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا حول تتبع جهات الاتصال لوباء COVID-19

<https://africacdc.org/download/guidance-on-contact-tracing-for-covid-19-pandemic/>

¹² إرشادات مؤقتة حول استخدام اختبارات المستضد السريع للاستجابة لـ COVID-19 - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

3. يجب على الدول الأعضاء إخطار وتبادل البيانات بشكل روتيني فيما يتعلق بحالات COVID-19 المؤكدة والوفيات والتعافي والاختبارات التي أجريت والعاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بمنظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة

الأمراض في إفريقيا لإبلاغ هذه التحديثات وغيرها باستمرار. أبلغ مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا عن طريق البريد الإلكتروني: AfricaCDCEBS@africa-union.org

4. يجب أن تستمر الدول الأعضاء في إرشاد عامة الناس بشأن السعي للحصول على رعاية طبية فورية لأولئك الذين تظهر عليهم أعراض حادة (مثل صعوبة التنفس).

5. يجب على الدول الأعضاء أن تضع أو تعزز التدابير الصحية العامة والاجتماعية القائمة عندما تبدأ الحالات في الارتفاع.

مصادر لمزيد من المعلومات :

مصادر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض (ACDC)

- المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض تحديثات كورونا : <https://africacdc.org/covid-19/>
- الموارد وإرشادات السياسة والرسوم البيانية : <https://africacdc.org/covid-19/covid-19-resources/>
- منظمة الصحة العالمية. التوجيه الفني. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>
- الشراكة من أجل الاستجابة القائمة على الأدلة لـ (COVID-19PERC) <https://preventepidemics.org/covid19/perc/>