



المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بيان الأدوية لعلاج مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19)

تشعر المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) بالقلق إزاء المعلومات غير الدقيقة التي يتم توزيعها من خلال وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية فيما يتعلق بالوقاية والعلاج من فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

بناء على مراجعة الأدلة وتقييم الخبراء، توصي Africa CDC بما يلي:

1 **يجب على الأطباء ألا يصفوا ، ولا يجب على الأفراد تناول الكلوروكين أو هيدروكسي كلوروكين لمنع أو علاج COVID-19** إلا في ظل التجارب السريرية أو الاستخدام الطارئ المراقب للتدخلات غير المسجلة والتحقيقية (MEURI) يمكن أن تسبب هذه الأدوية السمية العصبية و السمية للعين و للقلب وأشكال أخرى من السمية.

2 **يجب على الأطباء عدم وصف دواء لوبينافير / ريتونافير أو ريميسيديفير أو أدوية أخرى لمنع أو علاج COVID-19** باستثناء التجربة السريرية أو MEURI.

3 **يمكن استخدام الباراسيتامول أو الأسيتامينوفين أو الأيبوبروفين لتخفيف أعراض الحمى و / أو ألم عضلي** بسبب العدوى الفيروسية.

4 **يجب على الأطباء استخدام إرشادات قائمة على الأدلة عند علاج المرضى المصابين بعدوى COVID-19**، مثل تلك التي نشرتها منظمة الصحة العالمية (https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-(of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected).

5 **يجب أن تتبع التجارب السريرية و MEURI إرشادات منظمة الصحة العالمية** بشأن القضايا الأخلاقية في تفشي الأمراض المعدية. (https://www.who.int/ethics/publications/infectious-disease-outbreaks/en/).

ستواصل المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تحديث إرشاداتها باستمرار بناءً على أحدث الأدلة المتاحة.

